

彩色隐形眼镜除外可在佩戴任何一种隐形眼镜时使用。

软性

O₂

硬性

抛弃型(一次性)

未佩戴隐形眼镜时也可使用。

※有的眼药不得在佩戴软性隐形眼镜的状态下使用，
敬请仔细阅读外包装和附带说明书。

⚠ 使用注意事项



需要咨询的情况

- 以下人群在使用前请咨询医生、药剂师或注册销售者。
 - 正在接受医生治疗的人
 - 曾经因为药物出现过敏症状的人
 - 有以下症状的人
眼睛剧烈疼痛
 - 被诊断为以下疾病的人
青光眼
- 使用后如果出现下列症状，有可能是出现了副作用，请立即停止使用，携带本说明书前往咨询医生、药剂师或注册销售者。

相关部位	症状
皮肤	出疹、发红、瘙痒
眼睛	充血、瘙痒、肿胀、刺痛

- 以下情况请停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者。
 - 视线模糊未能得到改善的情况
 - 使用了2周，症状未得到改善的情况

适应症

佩戴软性隐形眼镜或硬性隐形眼镜时的不适感、眼疲劳、预防眼科疾病（如游泳后、灰尘、汗水进入眼睛时等情况）、视线模糊（结膜分泌物过多时等）

用法、用量

一次1~3滴，一天点眼5~6次。

●请遵守以下注意事项。

- 儿童使用时，必须要在监护人的监督指导下使用。
- 请勿将眼睛、眼睑、睫毛接触到容器口（结膜分泌物或细菌等有可能会混入眼药中污染眼药或造成眼药混浊）。此外，请勿使用已经混浊的眼药。
- 只能作为点眼使用。
- 请勿佩戴着彩色隐形眼镜使用。




成分、分量

成分	分量	功效
维生素B ₆ （盐酸吡哆醇）	0.1%	激活眼睛的组织代谢。
维生素B ₁₂ （氰钴胺）	0.02%	激发睫状肌的活力，改善眼疲劳。
甲基硫酸新斯的明	0.005%	通过改善聚焦调节功能，缓解眼疲劳等。

作为添加物，本品中含有乙二胺四乙酸二钠水合物、硼酸、聚维酮、张度剂、pH调节剂。

保管及使用时的注意事项

- 请放在阳光不能直射的阴凉处密封保管。为了保持产品的品质，请勿放置在汽车内或靠近取暖设备等的高温场所。已经放置在高温场所的产品，有可能会发生容器变形、药液泄漏、药液品质劣化，因此请勿继续使用。
- 请放在儿童触及不到的地方妥善保管。
- 请勿替换到其他容器中。（有可能造成误用或品质变质。）
- 请勿与他人共同使用。
- 请勿使用超过使用有效期的产品。另外，即使是在使用有效期内，开封后也请尽快使用。
- 根据保存状态的不同，成分的结晶有可能会令容器的点眼口附近或瓶盖内侧变红。这时请用清洁的纱布轻轻擦拭干净。
- 本药剂的红色是维生素B₁₂（氰钴胺）的颜色。点眼时，如果药液滴在了衬衫等处并染色的情况下，请立即用水洗净。



包装 12mL

（出于对自然环境的考虑，本品不附带便携袋。敬请理解。）

咨询

有关商品内容的咨询，请联系您购买商品的店铺或者下述联系方式。

参天制药株式会社“顾客咨询室” 电话号码 0120-127-023 受理时间 9:00~17:00（周末、节假日除外）

为了获得咨询内容的正确性，以及为了维持并提高回答的质量，电话将会被录音。