

免责声明

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由本公司临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，本公司概不承担一切责任。

Hyalein[®]S Mini ophthalmic solution

Hyalein S 迷你滴眼液适用于除彩色隐形眼镜外的所有隐形眼镜，佩戴期间可滴用。

软性

O₂

硬性

即抛

(一次性)

没有佩戴隐形眼镜的人士也可以使用。

*部分滴眼液在佩戴软性隐形眼镜时不可使用，请务必确认药品外盒和说明书。

使用注意事项

禁止事项

(若不遵守，可能会导致当前病情恶化，或容易引发副作用)

下述人群不要使用：

- (1) 曾因本品或本品所含成分引发过过敏症状的人
- (2) 被诊断为以下疾病的人：
干眼症、干燥综合征、史蒂文斯-约翰逊综合征、角膜感染
- (3) 有以下症状的人：
视力突然下降、眼睛剧烈疼痛
(以上情况若擅自用药，可能导致病情恶化。请前往就医，切勿自我诊治)



咨询事项

1. 以下人群在**使用前**请咨询医生、药剂师或注册销售者。
 - (1) 正在接受医生治疗的人
 - (2) 曾经因为药物等出现过过敏症状的人
 - (3) 除眼睛症状外，有以下症状的人
 - 口干、鼻腔干燥
 - 高烧、嘴唇糜烂、喉咙疼痛、皮肤大范围出疹、发红等的持续或急性剧烈恶化
 - (4) 被诊断为以下疾病的人：青光眼
2. **使用后**如果出现以下症状，有可能是出现了副作用，请立即停止使用，携带本说明书前往咨询医生、药剂师或注册销售者。

相关部位	症状
皮肤	出疹、发红、瘙痒
眼睛	充血、瘙痒、肿胀、疼痛、刺激感、异物感、眼屎
3. 以下情况请停止使用，并携带本说明书前往咨询医生、药剂师或注册销售者。
 - (1) 未改善视线模糊时
 - (2) 遵照用法用量，连续使用约一周后症状仍无好转，或感觉出现任何异常时
4. 即便症状已有好转，如需连续使用超过两周，也请前往咨询医生、药剂师或注册销售者。

效能或效果

缓和下列眼睛症状：干燥、异物感（滚动、刺痛感）、疲劳、模糊、佩戴软性隐形眼镜或硬性隐形眼镜时的不适感

用法及用量


请1次1滴、1天滴5~6次。

● 请遵守以下注意事项。

- (1) 儿童使用时，必须要在监护人的监督指导下使用。
- (2) 请勿将眼睛、眼睑、睫毛接触到容器口。
- (3) 只能作为点眼使用。
- (4) 佩戴彩色隐形眼镜时请勿使用。

一次性使用型

滴眼之后，已开封的容器中即使药液还有剩余，也请务必丢弃。



[打开方法]

请勿强行拉拽瓶盖，应轻轻拧开。


成分及分量

成分	分量
精制玻璃酸钠	0.1%

本品添加物包含：氨基己酸、依地酸二钠、等张剂、pH调节剂。

保管及使用注意事项

- (1) 请放在阳光不能直射的阴凉处保管。为了保持产品的品质，请勿放置在汽车内或靠近取暖设备等的高温场所。已经放置在高温场所的产品，有可能会发生容器变形、药液泄漏、药液品质劣化，因此请勿继续使用。
- (2) 请放在儿童触及不到的地方妥善保管。
- (3) 请勿替换到其他容器中。
(有可能造成误用或使品质发生变化。)
- (4) 请勿与他人共同使用。
- (5) 为防止瓶盖意外开启，请勿将本品放入裤子后袋等处。
- (6) 请勿使用超过使用有效期的产品。另外，即使是在使用有效期内，开封后也请尽快使用。



包装 0.3 mL × 10 支装