

免責事項

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由本公司临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，本公司概不承担一切责任。

Hyalein[®]S Mini ophthalmic solution

Hyalein S 迷你眼藥水適用於配戴各類型隱形眼鏡時使用(彩色隱形眼鏡除外)。

軟式

O₂

硬式

拋棄式
(一次性)

沒有配戴隱形眼鏡者亦可使用。

*有些眼藥水於配戴軟性隱形眼鏡時不可使用，請務必確認藥品外盒或隨附的說明書。

使用上的注意事項

禁止事項

(若未遵守則現在的症狀會惡化，或容易引發副作用)

以下人員請勿使用。

- (1) 曾因本藥劑或本藥劑的成分引發過敏症狀的人
- (2) 被診斷有以下疾病的人：
乾眼症、修格蘭氏症候群、史蒂芬強森症候群、角膜感染
- (3) 有以下症狀的人：
視力突然下降、眼睛劇烈疼痛
(症狀恐會惡化，請接受醫師診療，切勿自我判斷)



諮詢事項

1. 以下人員請在**使用前**諮詢醫生、藥劑師或合格銷售者。

- (1) 正在接受醫生治療的人
- (2) 曾因藥物等引起過敏症狀的人
- (3) 除眼睛症狀外，有以下症狀的人
 - 口乾、鼻腔乾燥
 - 高燒、嘴唇糜爛、喉嚨疼痛、皮膚大範圍的持續發疹/發紅等或急性劇烈惡化
- (4) 被診斷有以下疾病的人：青光眼

2. **使用後**出現以下症狀時可能是副作用，請立即停止使用，並攜帶本書，諮詢醫生、藥劑師或合格銷售者。

| 關聯部位 | 症狀 |
|------|------------------------|
| 皮膚 | 發疹、發紅、發癢 |
| 眼睛 | 充血、發癢、腫脹、疼痛、刺激感、異物感、眼屎 |

3. 下列情況下，請停止使用，並攜帶本書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

- (1) 視力模糊沒有改善的情況下
- (2) 依照用法、用量使用1週左右，症狀仍然沒有改善或感覺有異常時

4. 即使症狀有所改善，如使用超過兩週時，請諮詢醫生、藥劑師或合格銷售者。

療效或效果

緩和下列眼睛症狀：乾燥、異物感（滾動或刺痛感）、眼睛疲勞、視力模糊、配戴軟式隱形眼鏡或硬式隱形眼鏡時的不適感

用法及用量

一次1滴、一日點眼3～5次。

●請遵守下列注意事項


- (1) 讓幼兒使用時，請在監護者的指導監督下使用。
- (2) 容器尖端請勿碰到眼睛、眼瞼或睫毛。
- (3) 請只用於點眼。
- (4) 請勿在配戴著彩色隱形眼鏡時使用。

1次用盡型

點眼後，只要開封過即使藥水仍殘留，也請務必丟棄。

[開啟方式]

請輕輕轉開上蓋，不要硬拉。




成分及分量

| 成分 | 分量 |
|--------|------|
| 精製玻尿酸鈉 | 0.1% |

本产品包含以下添加物：氨基己酸、乙二胺四乙酸鈉水合物、等滲壓溶液及pH調節劑。

保管及使用上的注意事項

- (1) 請將產品存放在陰涼處，避免陽光直射。為維持產品品質，請勿放置在車上或放置於靠近暖房家電類的高溫場所。此外，由於有容器變形造成藥液外漏或是藥液品質劣化的疑慮，請勿使用曾置於高溫場所的產品。
- (2) 請存放在幼兒伸手不及之處。
- (3) 請勿更換到其他容器。
(可能造成品質改變，或導致誤用。)
- (4) 請勿與其他人共用。
- (5) 請注意，若將產品放在褲子後方口袋等，可能會造成蓋部打開。
- (6) 請勿使用已過期的產品。另外，即使在使用期限內，一旦開封後請盡速使用。



包裝 0.3mL×10瓶裝