

免责声明

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由本公司临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，本公司概不承担任何责任。

Hyalein[®]S

Hyalein S，可在佩戴除彩色隐形眼镜以外的任何隐形眼镜时使用。

软性

O₂

硬性

即抛
(一次性)

没有佩戴隐形眼镜的人士也可以使用。

※部分滴眼液在佩戴软性隐形眼镜时不可使用，请务必确认药品外盒和说明书。

⚠ 使用注意事项

⊗ 禁止事项

(若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用)

下述人群不要使用：

- (1) 因本药剂或本药剂成分出现过过敏症状的人群；
- (2) 已确诊有下列症状的人群：干眼症、舍格林综合征、史蒂文斯-约翰逊综合征、角膜感染；
- (3) 出现以下症状的人群：视力突然下降、眼睛剧烈疼痛
(可能会导致病症恶化，还请接受医师治疗，切勿自我诊治)



咨询事项

1. 下列人群在使用前请咨询医师或药剂师。

- (1) 正在接受医师治疗的人群
- (2) 因药物等出现过过敏症状的人群
- (3) 除眼睛症状外，还有以下症状的人群
 - 口干、鼻腔干燥
 - 高烧、嘴唇糜烂、喉咙疼痛、皮肤大范围起疹、发红等的持续或急性剧烈恶化
- (4) 已确诊有以下疾病的人群：青光眼

2. 使用后若出现以下症状，则可能是副作用，此时请立即停止使用，并携带本说明书咨询医师或药剂师。

| 相关部位 | 症状 |
|------|------------------------|
| 皮肤 | 起疹、发红，发痒 |
| 眼睛 | 充血、发痒、肿胀、疼痛、刺激感、异物感、眼屎 |

3. 出现以下情况时，请停止使用，并携带本说明书咨询医师或药剂师。

- (1) 眼睛模糊未得到改善时
- (2) 依照用法用量，使用约1周(大概用完第1瓶)，症状仍未得到改善或感觉有异常时(使用第2瓶之前，请咨询医师或药剂师)

4. 即使症状有所改善，但持续使用超过2周时，也请咨询医师或药剂师。

适应症

缓和下列眼睛症状：干燥、异物感(滚动、刺痛感)、疲劳、模糊、佩戴软性隐形眼镜或硬性隐形眼镜时的不适感

用法与用量

请1次1滴、1天滴5-6次。

●请遵守以下注意事项：

- (1) 儿童使用时，请在监护人的指导监督下使用；
- (2) 请勿让容器的前端碰触眼睛、眼睑或睫毛；
(由于眼屎或杂菌等的渗入，药液可能会被污染或变浑浊)，此外，请勿使用已经混浊的药水；
- (3) 请仅用于滴眼；
- (4) 佩戴彩色隐形眼镜时，请勿使用。

开瓶方法

将瓶盖拧至瓶身后……

滴眼液瓶口就会出现开口。



成分与分量

| 成分 | 分量 |
|--------|------|
| 精制玻璃酸钠 | 0.1% |

辅料含有氨基己酸、乙二胺四乙酸二钠盐水合物、葡萄糖酸氯己定溶液、张力剂、酸度调节剂。

保管及使用上的注意事项

- (1) 开始使用之前，请勿扭开瓶盖。
- (2) 避免阳光直射，保管在阴凉干燥处，请勿存放于轿车内或靠近暖气设备等释放高温的位置以维持产品品质。此外，若存放于高温场所，因容器变形导致药液渗漏、药液品质劣化等现象发生时，此时请勿使用。
- (3) 请保管在儿童触碰不到之处。
- (4) 请勿换装至其他容器中。(避免误用或变质)
- (5) 请勿与他人共用。
- (6) 请勿使用过期产品。此外，即使在有效期内，开瓶后请尽快用完。
- (7) 根据保存状态的不同，可能会在滴眼液瓶口周围或瓶盖内侧出现成分的白色结晶物体。若出现此情形，请使用干净的纱布轻轻擦拭。

