

免責事項

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由本公司的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，本公司不负任何法律责任。

Hyalein[®]S

Hyalein S，配戴隱形眼鏡(除彩色隱形眼鏡外)時皆可使用。

軟式

O₂

硬式

拋棄
(一次性)

沒有配戴隱性眼睛者亦可使用。

※有些眼藥水於配戴軟性隱形眼鏡時不可使用，請務必確認藥品外盒或隨附的仿單。

⚠ 使用時的注意事項

⊗ 禁止事項

(若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用)

有下列情況者請勿使用。

- (1) 曾因本藥劑或本藥劑的成分引發過敏症狀者。
- (2) 已確診有下列疾病者：乾眼症、修格蘭氏症候群、史蒂芬強森症候群、角膜感染
- (3) 有下列症狀者：視力突然下降、眼睛劇烈疼痛
(症狀恐會惡化，請接受醫師診療，切莫自我診治)



諮詢事項

1. 有下列情形者，於使用前請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。
 - (1) 正在接受醫師治療者；
 - (2) 曾因藥物引起過敏症狀者；
 - (3) 除眼睛症狀外，還有以下症狀者：
 - 口乾、鼻腔乾燥；
 - 發燒、嘴唇糜爛、喉嚨疼痛、皮膚大範圍的發疹/發紅等的持續或急性劇烈惡化；
 - (4) 患有以下疾病者：青光眼。
2. 使用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹/發紅、發癢
眼睛	充血、發癢、腫脹、疼痛、刺激感、異物感、眼屎
3. 出現下列情況下，請立刻停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。
 - (1) 視力模糊沒有改善的情況下；
 - (2) 依照用法用量，即使使用1週左右(大致使用完第1瓶)，症狀仍未改善或感覺有些異常時(使用第2瓶之前，請諮詢醫師或藥劑師)
4. 即使症狀有所改善，如需要使用超過兩週時，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

適應症

緩和下列眼睛症狀：乾燥、異物感(滾動/刺痛感)、眼睛疲勞、視力模糊、配戴軟式隱形眼鏡或硬式隱形眼鏡時的不適感

用法用量

1次1滴，1天點眼5~6次。

●請遵守下列注意事項：

- (1) 讓兒童使用時，請在家長的指導監督下使用；
- (2) 容器的前端請勿碰觸眼睛、眼瞼或睫毛
(由於眼屎或雜菌等的滲入，藥液將會受汙染或混濁的可能)。此外，請勿使用變混濁的藥水；
- (3) 僅限使用於點眼用途；
- (4) 配戴彩色隱形眼鏡時，請勿使用。

開瓶方法

將瓶蓋轉緊頂到瓶身後…… 眼藥水瓶口就會出現開口。



成分及含量

成分	含量
精製透明質酸鈉	0.1%

賦形劑含有氨基己酸、乙二胺四乙酸鈉水合物、葡萄糖酸洛赫西定溶液、張力劑、pH調整劑。

保管及使用上的注意事項

- (1) 開始使用之前，請勿扭開瓶蓋。
- (2) 避免陽光直射，保管在陰涼乾燥之處，請勿存放於轎車內或靠近暖氣設備等釋放高溫的位置以維持產品品質。此外，若存放於高溫場所，因容器變形恐有藥液滲漏、藥液品質劣化等現象發生時，請勿使用。
- (3) 請保管在兒童觸碰不到之處。
- (4) 請勿換裝至其他容器中。(避免誤用或變質)
- (5) 請勿與他人共用。
- (6) 請勿使用過期藥物。此外，開瓶後，即使是在保質期內，也請盡速使用完畢。
- (7) 在部分保存狀態下，在眼藥瓶口周圍或瓶蓋內側可能會出現成分的白色結晶物體。若出現該情形，請使用乾淨的紗布輕輕擦拭。

