

免责声明

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由本公司临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，本公司概不承担一切责任。

Sante Medical Guard & Repair

使用上的注意事項

諮詢事項

1. 以下人員請在使用前諮詢醫生、藥劑師或合格銷售者。

- (1) 正在接受醫生治療的人
- (2) 曾因藥物等引起過敏症狀的人
- (3) 有以下症狀的人：劇烈的眼睛疼痛
- (4) 被診斷有以下疾病的人：青光眼

2. 使用後出現以下症狀時可能是副作用，請立即停止使用，並攜帶本書，諮詢醫生、藥劑師或合格銷售者。

關聯部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢
眼睛	充血、發癢、腫脹、刺痛

3. 有以下情況時請停止使用，並攜帶本書，諮詢醫生、藥劑師或合格銷售者。

- (1) 視線模糊沒有改善時
- (2) 使用約5~6日後症狀依然未改善時

用法及用量

1次1~3滴，1天請點眼5~6次。

請遵守下列注意事項

- (1) 如果過度使用，可能會感到異常的刺眼，反而會引起充血。
- (2) 讓小孩使用時，請在保護者的指導監督下使用。
- (3) 容器尖端請勿碰觸到眼睛、眼瞼或睫毛（因眼屎或雜菌等混入，可能導致藥液受到污染或變得混濁）。此外，不要使用混濁的眼藥水。
- (4) 請勿在佩戴著軟式隱形眼鏡時使用。
- (5) 請只用於點眼。



療效或效果

預防由紫外線等光線引起的眼部炎症（如雪盲等）、眼瞼炎（眼瞼接觸性皮炎）、眼科疾病（如游泳後、灰塵、汗水進入眼睛等情況）、眼疲勞、眼部瘙癢、視眼模糊（結膜分泌物過多時等）、結膜充血以及佩戴硬性隱形眼鏡時的不適感


成分及分量

成分	分量	作用
硫酸鋅水合物	0.25%	有助於修復受損的組織並抑制炎症。
硫酸軟骨素鈉酯	0.5%	保護角膜並透過防止淚液蒸發來滋潤眼睛。
牛磺酸	0.5%	活化眼部組織新陳代謝。
維他命B6 (鹽酸吡哆醇)	0.1%	活化眼部組織新陳代謝。
泛醇	0.05%	活化眼部組織新陳代謝。
L-天冬氨酸鉀	0.5%	提高眼部組織呼吸。
甲硫酸新斯狄格明	0.005%	透過改善調節焦距功能，改善眼睛疲勞等。
氯苯那敏	0.03%	抑制組織胺的作用，抑制眼睛發炎和眼睛癢。
ε-氨基己酸	1.0%	緩解造成炎症成因而物質的產生。
鹽酸四氫唑啉	0.05%	抑制結膜（眼白部分）的充血。

作為添加物，含有依地酸鈉水合物、氯丁醇、羥基氯苯胺、硼酸、玻尿酸鈉、聚山梨醇酯80、d-龍腦、卜薄荷醇、滲透壓調節劑、pH值調節劑。

保管及使用上的注意事項

- (1) 請將產品密封存放在陰涼處，避免陽光直射。為維持產品品質，請勿放置在車上或放置於靠近暖房家電一類的高溫場所。此外，由於有容器變形造成藥液外漏或是藥液品質劣化的疑慮，請勿使用曾置於高溫場所的產品。
- (2) 請存放在幼兒構不到的地方。
- (3) 請勿更換到其他容器。（可能造成品質改變，或導致誤用。）
- (4) 請勿與其他人共用。
- (5) 請勿使用已過期的產品。另外，就算是在使用期限內，藥袋一旦開封後仍請盡速使用。
- (6) 根據保存狀態，成分可能會在容器的點眼口周圍或瓶蓋內側結晶並呈現白色。如果發生這種情況，請使用乾淨的紗布輕輕擦拭乾淨後再使用。



包裝 12mL

(為了保護自然環境，本產品未附帶收納袋，敬請理解。)