

免责声明

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由本公司的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，本公司不负任何法律责任。

Sante AL Cool® II

⚠ 使用注意事項



諮詢事項

1. 以下人員請在使用前諮詢醫生、藥劑師或合格銷售者。
 - (1) 正接受醫生治療的人
 - (2) 曾因藥物等引起過敏症狀的人
 - (3) 有以下症狀的人
劇烈的眼睛疼痛
 - (4) 曾接受以下診斷的人
青光眼
2. 使用後出現以下症狀時可能是副作用，請立即停止使用，並攜帶本書，諮詢醫生、藥劑師或合格銷售者。

關聯部位	症狀
皮膚	起疹、泛紅、瘙癢
眼睛	充血、瘙癢、腫脹、刺痛

3. 以下情形請立即停止使用，並攜帶本書，諮詢醫生、藥劑師或合格銷售者。
 - (1) 視線模糊未改善時
 - (2) 使用5~6天症狀依然未改善時

用法、用量

一次1~3滴、一日點眼5~6次。

●請遵守以下注意事項。

- (1) 若是過度使用，會感覺到異常的眩光，或是反而引起充血。
- (2) 讓小孩使用時，請在保護者的指導監督下使用。
- (3) 容器尖端請勿碰觸到眼睛、眼瞼或睫毛（因為可能混入了眼屎或雜菌，會污染藥液或使藥液混濁）。另外，請勿使用混濁的藥劑。
- (4) 請勿在佩戴著軟式隱形眼鏡時使用。
- (5) 請只用於點眼。



適應症

預防眼部瘙癢、結膜充血、眼瞼炎（眼瞼接觸性皮炎）、眼科疾病（如游泳後，灰塵、汗水進入眼睛時等情況）、由紫外線等光線引起的眼部炎症（如雪盲等）、眼疲勞、視線模糊（結膜分泌物過多時等）以及佩戴硬性隱形眼鏡時的不適感

成分、含量

成分	含量	作用
撲爾敏（抗組胺劑）	0.03%	抑制組胺的作用（即過敏症狀的原因），減緩眼部炎症、瘙癢。
甘草酸二鉀	0.25%	抑制過敏成因物質的排放，緩解炎症。
ε-氨基己酸	1.0%	緩解造成炎症成因物質的產生。
鹽酸四氫唑啉	0.03%	使血管收縮，抑制結膜（眼白部分）充血。
牛磺酸	1.0%	活化細胞代謝，促進修復因發炎受損的眼睛組織。
泛醇	0.1%	

作為添加物，含有依地酸鈉水合物、羥基氯苯胺、d-樟腦、d-龍腦、l-薄荷醇、滲透壓調節劑、Ph值調節劑。

〈成分、容量相關的注意事項〉

本劑於點藥後，偶爾會有在嘴裡感覺到甜味的情況。這是由於其中的甘草酸二鉀成分透過淚腺進入嘴裡而導致的，並非因品質等方面的異常所引起。

保管及操作注意事項

- (1) 請捏緊後保管在不會直接照射到陽光的陰涼場所。為保持產品品質，請勿放置在汽車內或接近暖氣設備等高溫場所。另外，放置於高溫場所後，會有容器變形、藥液漏出、藥液品質劣化等疑慮，請勿使用。
- (2) 請保管在幼小孩童拿不到的地方。
- (3) 請勿換裝到另一個容器。（會導致誤用或造成品質的改變。）
- (4) 請勿與他人共用。
- (5) 請勿使用已超過使用期限的產品。開封後，即使尚在使用期限內，亦請盡快使用。
- (6) 依保存狀態的不同，在容器的點藥口周圍或瓶蓋內側會有白色的成分物結晶。此種情況下，請用清潔的紗布輕輕擦拭後使用。

