

免责声明

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由本公司临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，本公司概不承担任何责任。

Sante FX NEO®

⚠ 使用注意事项



需要咨询的情况

- 1、以下人群在使用前请咨询医生、药剂师或注册销售者。
 - (1) 正在接受医生治疗的人
 - (2) 曾经因为药物出现过过敏症状的人
 - (3) 有以下症状的人
眼睛剧烈疼痛
 - (4) 被诊断为以下疾病的人
青光眼
- 2、使用后如果出现下列症状，有可能是出现了副作用，请立即停止使用，携带本说明书前往咨询医生、药剂师或注册销售者。

相关部位	症状
皮肤	出疹、发红、瘙痒
眼睛	充血、瘙痒、肿胀、刺痛

- 3、以下情况请停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者。
 - (1) 视线模糊未能得到改善的情况
 - (2) 使用了5~6天，症状未得到改善的情况

用法、用量

一次2~3滴，一天点眼5~6次。

●请遵守以下注意事项。

- (1) 如果过度使用，有可能会感到异常的炫目感或者反而会导致眼部充血。
- (2) 儿童使用时，必须要在监护人的监督指导下使用。
- (3) 请勿将眼睛、眼睑、睫毛接触到容器口（结膜分泌物或细菌等有可能会混入眼药中污染眼药或造成眼药混浊）。此外，请勿使用已经混浊的眼药。
- (4) 请勿佩戴着软性隐形眼镜使用。
- (5) 只能作为点眼使用。



扭转式瓶盖的开盖方法

请务必将瓶盖向上拽起打开。

注：如果按住容器的中心开盖的话，有可能会造成药液溅出。



●打开方法
用整个拇指拿着盖子并用整个拇指拧。



●关闭方法
充分往下按压，直到停住为止。

适应症

预防眼疲劳、结膜充血、眼部瘙痒、眼科疾病（如游泳后，灰尘、汗水进入眼睛等情况）、由紫外线等光线引起的眼部炎症（如雪盲等）、视线模糊（结膜分泌物过多时等）、眼睑炎（眼睑接触性皮炎）以及佩戴硬性隐形眼镜时的不适感

成分、分量

成分	分量	功效
甲基硫酸新斯的明	0.005%	通过改善聚焦调节功能，缓解眼疲劳等。
牛磺酸	1.0%	激活眼睛的组织代谢。
L-天门冬氨酸钾	1.0%	提高眼部组织的呼吸。
盐酸四氢唑啉	0.05%	抑制结膜（眼白部位）的充血。
扑尔敏	0.03%	抑制组胺的功能，缓解眼部炎症及眼部瘙痒。
ε-氨基己酸	1.0%	抑制导致炎症的物质的产生。

作为添加物，本品中含有三氯叔丁醇、本扎氯铵氯化物、硼酸、右旋龙脑、dl-樟脑、l-薄荷脑、pH调节剂。

保管及使用时的注意事项

- (1) 请放在阳光不能直射的阴凉处密封保管。为了保持产品的品质，请勿放置在汽车内或靠近取暖设备等的高温场所。已经放置在高温场所的产品，可能会出现容器变形、药液泄漏、药液品质劣化，因此请勿继续使用。
- (2) 请放在儿童触及不到的地方妥善保管。
- (3) 请勿替换到其他容器中。（有可能造成误用或品质变质。）
- (4) 请勿与他人共同使用。
- (5) 请勿使用超过使用有效期的产品。另外，即使是在使用有效期内，开封后也请尽快使用。
- (6) 根据保存状态的不同，成分的结晶有可能会令容器的点眼口附近或瓶盖内侧变白。这时请用清洁的纱布轻轻擦拭干净。

