

## 免责声明

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由本公司临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，本公司概不承担任何责任。

# Sante FX AL

## ⚠ 使用注意事项

### ❌ 禁止事项

(如果不遵守禁止事项，则有可能导致当前症状恶化或产生副作用、事故)

1. 以下人群请勿使用本品。  
因本品或本品成分导致过敏症状的人
2. 如果与点鼻药同时使用，则在使用后请勿驾驶车辆或进行机械类操作。(有可能出现瞌睡等情况)



### 咨询事项

1. 以下人群在使用前请咨询医生、药剂师或注册销售者。
  - (1) 正在接受医生治疗的人
  - (2) 正在接受脱敏疗法等抗过敏治疗的人
  - (3) 孕妇或认为已怀孕的人
  - (4) 曾经因为药物出现过敏症状的人
  - (5) 有以下症状的人：眼睛剧烈疼痛
  - (6) 被诊断为以下疾病的人：青光眼
  - (7) 有尚未明确是过敏导致的症状还是其他原因导致的症状的人  
特别是在以下情况下无法断定是否属于过敏导致的症状，所以请在使用前咨询医生。
    - 仅有一侧眼睛出现症状的情况
    - 仅有眼睛出现症状，鼻子未发现症状的情况
    - 影响视力的情况

2. 使用后如果出现下列症状，有可能是出现了副作用，请立即停止使用，携带本说明书前往咨询医生、药剂师或注册销售者。

相关部位	症状
皮肤	出疹、发红、瘙痒
眼睛	充血、瘙痒、肿胀、刺痛

极罕见地有可能出现以下严重症状。如果出现这种情况，请立即接受医生治疗。

症状名称	症状
休克 (过敏反应)	使用后立即出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音嘶哑、打喷嚏、喉咙瘙痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状


3. 以下情况请停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者。
  - (1) 视线模糊未能得到改善的情况
  - (2) 使用了2天，症状未得到改善的情况
4. 如果使用超过2周后症状得到改善，也请携带本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者。

## 用法、用量

一次1~2滴，一天点眼4~6次。

### 《用法和用量的相关注意事项》

- (1) 请严格遵守用法和用量。
- (2) 儿童使用时，必须要在监护人的监督指导下使用。
- (3) 请勿将眼睛、眼睑、睫毛接触到容器口(结膜分泌物或细菌等有可能会混入眼药中污染眼药或造成眼药混浊)。此外，请勿使用已经混浊的眼药。
- (4) 请勿佩戴着隐形眼镜使用。
- (5) 只能作为点眼使用。



### 扭转式瓶盖的开盖方法

请务必将瓶盖向上拽起打开。

注：如果按住容器的中心开盖的话，有可能会造成药液溅出。



● 打开方法  
用整个拇指拿着盖子，并用整个拇指拧。



● 关闭方法  
充分往下按压，直到停住为止。

## 适应症

缓解花粉或室内灰尘等导致的以下眼部过敏症状：眼部瘙痒、眼部充血、视线模糊(结膜分泌物过多时等)、多泪、异物感(有异物滚动的感觉)

## 成分、分量

成分	分量	功效
色甘酸钠	1.0%	抑制组胺等的分泌，抑制眼部瘙痒、眼部充血。
扑尔敏	0.03%	抑制组胺的作用，抑制眼部炎症、眼部瘙痒。
ε-氨基己酸	1.0%	抑制导致炎症的物质的产生。
牛磺酸	1.0%	激活眼睛的组织代谢。
L-天门冬氨酸钾	1.0%	提高眼部组织的呼吸。

作为添加物，本品中含有乙二胺四乙酸二钠滴定液、氯丁醇、苯扎氯铵、d-樟脑、d-龙脑、l-薄荷脑、pH调节剂。

## 保管及使用时的注意事项

- (1) 请放在阳光不能直射的阴凉处密封保管。为了保持产品的品质，请勿放置在汽车内或靠近取暖设备等的高温场所。已经放置在高温场所的产品，有可能会发生容器变形、药液泄漏、药液品质劣化，因此请勿继续使用。
- (2) 请放在儿童触及不到的地方妥善保管。
- (3) 请勿替换到其他容器中。(有可能造成误用或品质变质。)
- (4) 请勿与他人共同使用。
- (5) 请勿使用超过使用有效期的产品。另外，即使是在使用有效期内，开封后也请尽快使用。
- (6) 根据保存状态的不同，成分的结晶有可能会令容器的点眼口附近或瓶盖内侧变白。这时请用清洁的纱布轻轻擦拭干净。

