

## 免責事項

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由本公司的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，本公司不承担任何法律责任。

# Sante FX AL

## ⚠ 使用注意事項

### ❌ 禁止事項

(若不遵守可能使現在的症狀更加惡化，或容易引起副作用及事故)

1. 有下列情形者，請勿使用。  
曾因本藥劑或本藥劑成分引起過敏症狀的人
2. 若與點鼻藥劑併用，使用後請勿操作交通工具或機械類。  
(可能出現嗜睡症狀)



### 諮詢事項

1. 有以下情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生。
  - (1) 正在接受醫師治療者
  - (2) 正在接受減敏療法等過敏治療者
  - (3) 孕婦或可能已懷孕者
  - (4) 曾對藥物等產生過敏反應者
  - (5) 有以下症狀者：眼睛有劇烈的刺痛感
  - (6) 以下病症確診者：青光眼
  - (7) 無法確定為過敏或其他因素所引起之症狀者  
特別是出現以下症狀，無法判斷是否因過敏所引起時，請於使用前洽詢醫師。
    - 只有單眼出現症狀
    - 只有眼睛出現症狀，鼻子未出現症狀
    - 對視力造成影響
2. 使用本藥劑後，若發生以下副作用所引起之症狀，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

關聯部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、搔癢
眼睛	充血、搔癢、浮腫、刺痛

偶有發生以下重症之可能性。發生時，請立即接受醫師診治。

症狀名稱	症狀
休克 (過敏性休克)	使用後立即出現皮膚搔癢、蕁麻疹、喉嚨沙啞、嘔吐、喉嚨搔癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀時

3. 發生以下狀況時，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。
  - (1) 眼睛的搔癢狀態不見改善
  - (2) 連續使用2日仍不見改善
4. 症狀有所改善但連續使用超過2週以上時，請持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

## 用法、用量

一次1~2滴、一日點眼4~6次。

### 〈關於用法用量注意事項〉

- (1) 請確實遵守用法與用量。
- (2) 使用於兒童身上時，請務必在家長指導監督下使用。
- (3) 容器先端請勿碰觸眼睛、眼瞼、睫毛(可能因混入眼睛分泌物或細菌等而造成藥水汙染，或變成混濁等情形)。此外，藥水變混濁時請勿繼續使用。
- (4) 請勿在配戴隱形眼鏡狀態下使用。
- (5) 僅作為點眼用藥水使用。



## 旋蓋的開封方式

開啟時請務必將旋蓋朝上。

注：擠壓容器中心進行開封時，可能導致藥液噴出。



● 開啟方式  
以整個拇指拿住瓶蓋，並用整個拇指來扭轉。



● 關閉方式  
直到鎖緊前都要確實壓住。

## 適應症

可舒緩花粉、塵埃(室內灰塵)等所引起之下列眼睛過敏症狀：眼睛搔癢、眼睛充血、視力模糊(眼睛分泌物變多等)、流眼水、異物感(眼中有顆粒感)

## 成分、含量

成分	含量	作用
色甘酸鈉	1.0%	抑制組織胺的釋放，緩解眼睛搔癢及充血。
撲爾敏	0.03%	抑制組織胺的作用，緩解眼睛發炎及搔癢。
ε-氨基己酸	1.0%	抑制造成發炎之原因物質的生成。
牛磺酸	1.0%	活化眼睛的組織代謝。
L-天門冬氨酸鉀	1.0%	提高眼睛組織呼吸。

作為添加物，含有依地酸鈉水合物、氯丁醇、氯化苯二甲煙鈹、d-樟腦、d-龍腦、l-薄荷腦、pH值調節劑。

## 保管及操作注意事項

- (1) 請蓋緊後保管於不受陽光直射的陰涼場所。為維持產品品質，請避免放置於汽車內或靠近暖氣機具等高溫場所。此外，放置於高溫場所後，可能造成容器變形或藥水外漏等使藥水品質劣化，請勿繼續使用。
- (2) 請保存於兒童無法拿取處。
- (3) 請勿以其他容器盛裝。  
(可能造成誤用或變質。)
- (4) 請避免與他人共用。
- (5) 請勿使用超過保存期限的製品。即使尚未超過保存期限，開封後請盡速使用。
- (6) 依保存狀態可能造成容器點眼藥口周圍產生成分結晶，或是在瓶蓋內有白色附著物。請以乾淨的紗布輕輕擦拭後再使用。

