

## 免责声明

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由本公司的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，本公司不负任何法律责任。

# Sante FX Contact

除彩色隱形眼鏡外，  
適用於配戴所有隱形眼鏡狀態下使用。

軟式

O<sub>2</sub>

硬式

拋棄式  
(Disposable)

未配戴隱形眼鏡者亦可使用。

※部分眼藥水無法在配戴軟式隱形眼鏡狀態下使用，請參閱外盒或所附說明書等內容。

## ⚠ 使用注意事項



### 諮詢事項

- 有以下情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生。
  - (1) 正在接受醫師治療者
  - (2) 曾對藥物等產生過敏反應者
  - (3) 有以下症狀者：眼睛有劇烈的刺痛感
  - (4) 以下病症確診者：青光眼
- 使用本藥劑後，若發生以下副作用所引起之症狀，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

| 關聯部位 | 症狀          |
|------|-------------|
| 皮膚   | 發疹、發紅、搔癢    |
| 眼睛   | 充血、搔癢、浮腫、刺痛 |

- 發生以下狀況時，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。
  - (1) 眼睛的搔癢狀態不見改善
  - (2) 若連續使用2週左右症狀仍不見改善

## 用法、用量

一次1~3滴、一日點眼5~6次。

### ●請遵守以下注意事項。

- (1) 使用於兒童身上時，請務必在家長指導監督下使用。
- (2) 容器先端請勿碰觸眼睛、眼瞼、睫毛（可能因混入眼睛分泌物或細菌等而造成藥水污染，或變成混濁等情形）。此外，藥水變混濁時請勿繼續使用。
- (3) 僅作為點眼用藥水使用。
- (4) 請勿於配戴彩色隱形眼鏡時使用。



## 旋蓋的開封方式

開啟時請務必將  
旋蓋朝上。

注：擠壓容器中心進行開封時，可能導致藥液噴出。



●開啟方式  
以整個拇指按住瓶蓋，並用整個拇指來扭轉。



●關閉方式  
直到鎖緊前都要確實壓住。

## 適應症

眼睛疲勞、預防眼疾（游泳後、灰塵或汗水等進入眼睛時等）、因紫外線或其他光線所造成的眼疾（雪盲症等）、配戴軟式或硬式隱形眼鏡時的不適感、眼睛搔癢、視力模糊（眼睛分泌物較多時等）

## 成份、含量

| 成分       | 含量   | 作用              |
|----------|------|-----------------|
| 牛磺酸      | 1.0% | 活化眼睛的組織代謝。      |
| L-天門冬氨酸鉀 | 1.0% | 提高眼睛組織呼吸。       |
| 泛醇       | 0.1% | 補給營養成分(維他命)。    |
| ε-氨基己酸   | 1.0% | 抑制造成發炎之原因物質的生成。 |

作為添加物，含有依地酸鈉水合物、葡萄糖酸克羅希西汀、氯丁醇、d-龍腦、d-樟腦、l-薄荷腦、pH值調節劑。

## 保管及使用上注意事項

- (1) 請蓋緊後保管於不受陽光直射的陰涼場所。為維持產品品質，請避免放置於汽車內或靠近暖氣機具等高溫場所。此外，放置於高溫場所後，可能造成容器變形或藥水外漏等使藥水品質劣化，請勿繼續使用。
- (2) 請保存於兒童無法拿取處。
- (3) 請勿以其他容器盛裝。（可能造成誤用或變質。）
- (4) 請避免與他人共用。
- (5) 請勿使用超過保存期限的製品。即使尚未超過保存期限，開封後請於3個月內使用完畢。
- (6) 依保存狀態可能造成容器點眼藥口周圍產生成分結晶，或是在瓶蓋內有白色附著物。請以乾淨的紗布輕輕擦拭後再使用。

