免责事项

・本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
・多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。
其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
・多语种产品资料由本公司临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
・关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，本公司概不承担一切责任。

Sante® Antibacterial New Eye Drops

⚠ 使用注意事项

禁止的事项
（如不遵守，现在的症状有可能会恶化或者容易出现副作用）

1、下述人群请不要使用。
因本药剂或本药剂成分出现过过敏症状的人群。

2、请勿长时间连续使用。

需要咨询的情况

1、以下人群在使用前请咨询医生、药剂师或注册销售者。
（1）正在接受医生治疗的人
（2）曾经因为药物出现过敏症状的人
（3）有以下症状的人：眼睛剧烈疼痛

2、使用后如果出现下列症状，有可能是出现了副作用，请立即停止使用，携带本说明书前往咨询医生、药剂师或注册销售者。

相关部位	症　状
皮肤	出疹、发红、瘙痒
眼睛	充血、瘙痒、肿胀、刺痛

偶尔会出现下述重症。
此时请立即就医。

症状的名称	症　状
休克（过敏性）	使用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、气闷、心悸、意识不清等症状。

3、使用了3～4天，症状未得到改善的情况下，请停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者。

用法、用量
一次1～2滴，一天点眼3～5次。

●请遵守以下注意事项。
（1）儿童使用时，必须要在监护人的监督指导下使用。
（2）请勿将眼睛、眼睑、睫毛接触到容器口（结膜分泌物或细菌等有可能会混入眼药中污染眼药或造成眼药混浊）。此外，请勿使用已经混浊的眼药。
（3）请勿佩戴着软性隐形眼镜使用。
（4）只能作为点眼使用。

适应症
预防结膜炎（流行性角结膜炎）、麦粒肿、眼睑炎（眼睑接触性皮炎）、眼部瘙痒

有关“麦粒肿”的注意事项：请勿揉搓眼睑或以其他方式给予眼睛刺激。（另外，某些情况下麦粒肿易由体质原因引起，容易在过度疲劳及睡眠不足等体力低下时发生，为避免疲劳请保证充足的睡眠。）

成分、分量

成分	分量	功效
磺胺甲基异恶唑（抗菌成分）	4.0%	持续性磺胺类药物对引起结膜炎及麦粒肿的细菌具有抗菌作用。
扑尔敏	0.03%	抑制组胺的功能，缓解眼部充血、瘙痒等。
甘草酸二钾	0.25%	抑制眼部炎症。
牛磺酸	0.5%	激活眼睛的组织代谢。

作为添加物，本品中含有乙二胺四乙酸二钠水合物、羟丙甲纤维素、本扎氯铵氯化物、pH调节剂。

<关于成分、分量的注意事项>
本眼药水在点眼后，有可能嘴里会感觉到甜味。这是因为作为主要成分的磺胺甲基异恶唑和甘草酸二钾通过泪道流入口中造成，不是品质方面的异常。

保管及使用时的注意事项



（1）请放在阳光不能直射的阴凉处密封保管。为了保持产品的品质，请勿放置在汽车内或靠近取暖设备等的高温场所。已经放置在高温场所的产品，有可能会出现容器变形、药液泄漏、药液品质劣化，因此请勿继续使用。
（2）请放在儿童触及不到的地方妥善保管。
（3）请勿替换到其他容器中。
（有可能造成误用或品质变质。）
（4）请勿与他人共同使用。
（5）请勿使用超过使用有效期的产品。另外，即使是在使用有效期内，开封后也请尽快使用。
（6）根据保存状态的不同，成分的结晶有可能会令容器的点眼口附近或瓶盖内侧变白。这时请用清洁的纱布轻轻擦拭干净。