

## 면책사항

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다.  
그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본국 외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 당사에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 당사는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

# Sante<sup>®</sup> Medical Antibacterial

## ⚠ 사용상의 주의

### ⊗ 금지 사항

(지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용이 나타나기 쉽습니다)  
장기 연용하지 마십시오.



### 문의가 필요한 경우

- 다음과 같은 사람은 사용하기 전에 의사나 약사 또는 등록판매자에게 문의하시기 바랍니다.
  - (1) 의사의 치료를 받고 있는 사람
  - (2) 약 등으로 알레르기 증상이 나타난 적이 있는 사람
  - (3) 다음과 같은 증상이 있는 사람  
심한 눈의 통증
- 사용 후에 다음과 같은 증상이 나타난 경우는 부작용일 가능성이 있으므로 즉시 사용을 중지하고 이 문서를 지참하고 의사나 약사 또는 등록판매자에게 문의하시기 바랍니다.

| 관계 부위 | 증 상                  |
|-------|----------------------|
| 피부    | 발진, 발적, 가려움          |
| 눈     | 충혈, 가려움, 부종, 따갑고 아프다 |

- 3~4일 사용해도 증상이 개선되지 않을 때는 사용을 중지하고 이 문서를 지참하고 의사나 약사 또는 등록판매자에게 문의하시기 바랍니다.

## 용법 및 용량

1회 1방울, 1일 3~5회 점안해 주십시오.

### ● 다음의 주의 사항을 지켜 주십시오.

- (1) 어린이가 사용할 때는 보호자가 지도 감독해 주십시오.
- (2) 용기 끝을 눈이나 눈꺼풀, 속눈썹 등에 닿지 않도록 하십시오.
- (3) 소프트 콘택트렌즈를 착용한 채 사용하지 마십시오.
- (4) 점안용으로만 사용해 주십시오.




## 1회용 타입

한 번 연 용기는 점안 후 약액이 남아 있어도 반드시 버리십시오.

### ●여는 방법

뚜껑 부분을無理하게 비틀지 말고 천천히 돌려서 열어 주십시오.



## 효능 및 효과

다래끼, 결막염(유행성 결막염), 안검염(눈꺼풀의 염증), 눈의 가려움  
**'다래끼' 관련 주의 사항:** 눈꺼풀을 문지르거나 기타 눈에 자극을 주지 않도록 주의하시기 바랍니다. (단, 다래끼는 체질적으로 생기기 쉬운 경우가 있으므로 과로나 수면 부족 등 체력이 저하했을 때 생기기 쉬우므로 과로를 피하고 충분한 수면을 취해주시기 바랍니다.)

## 성분 및 용량

| 성분           | 분량    | 효능                                |
|--------------|-------|-----------------------------------|
| 설파메톡사졸(항균성분) | 4.0%  | 지속성 설파제로 다래끼나 결막염의 원인균에 항균 작용합니다. |
| 글리시리진산이칼륨    | 0.25% | 환부의 염증을 억제합니다.                    |
| 타우린          | 1.0%  | 눈 조직의 신진대사를 활발히 합니다.              |
| 비타민 B6       | 0.1%  | 눈 조직의 신진대사를 활발히 합니다.              |

에데트산나트륨수화물, 하이프로멜로스, 붕산, pH 조절제를 함유합니다.

## (성분 및 분량 관련 주의 사항)

이 약제는 점안 후 입안에 쓴맛 또는 단맛을 느낄 수 있습니다.

이것은 주성분 설파메톡사졸 및 글리시리진산이칼륨이 누도(눈물길)를 통과해 입안으로 흘러 들어가 생기는 현상으로 물질 등의 이상은 아닙니다.

## 보관 및 취급상의 주의

- (1) 직사광선이 닿지 않는 선선한 곳에 보관해 주십시오. 제품 품질을 유지하기 위해 자동차 안이나 난방기구 가까이 등 고온이 되는 장소에 두지 마십시오. 또한, 고온이 되는 장소에 보관하면 용기가 변형돼 약액이 새거나 약액 품질이 저하될 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.
- (2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- (3) 다른 용기에 바꿔넣지 마십시오.  
(오용 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다.)
- (4) 다른 사람과 공용하지 마십시오.
- (5) 이 약제는 빛에 의해 약액이 변질하는 것을 방지하기 위해 착색 용기 및 착색 봉지를 사용하고 있지만, 보관할 때도 상자에 넣는 등 빛이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- (6) 바지 주머니 등에 제품을 넣으면 뚜껑이 열릴 수 있으므로 주의하십시오.
- (7) 사용 기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오. 또한, 사용 기한 내라도 봉지를 개봉 후 가능한 한 빨리 사용해 주십시오.

