

免责声明

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由本公司临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，本公司概不承担任何责任。

Sante[®] Medical Antibacterial

⚠ 使用注意事项

⊗ 禁止的事项
(如不遵守，现在的症状有可能会恶化或者容易出现副作用)
请勿长时间连续使用。

👤 需要咨询的情况

- 1、以下人群在使用前请咨询医生、药剂师或注册销售者。
 - (1) 正在接受医生治疗的人
 - (2) 曾经因为药物出现过敏症状的人
 - (3) 有以下症状的人
眼睛剧烈疼痛
- 2、使用后如果出现下列症状，有可能是出现了副作用，请立即停止使用，携带本说明书前往咨询医生、药剂师或注册销售者。

相关部位	症状
皮肤	出疹、发红、瘙痒
眼睛	充血、瘙痒、肿胀、刺痛

- 3、使用了3~4天，症状未得到改善的情况下，请停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者。

用法、用量

一次1滴，一天点眼3~5次。

●请遵守以下注意事项。

- (1) 儿童使用时，必须要在监护人的监督指导下使用。
- (2) 请勿将眼睛、眼睑、睫毛接触到容器口。
- (3) 请勿佩戴着软性隐形眼镜使用。
- (4) 只能作为点眼使用。




抛弃型设计

滴眼后，即使还有药水残留，也应丢弃已开封的滴眼剂。

[打开方法]

请勿强行拉拽瓶盖，应轻轻拧开。



适应症

预防麦粒肿、结膜炎（流行性角结膜炎）、眼睑炎（眼睑接触性皮炎）、眼部瘙痒

有关“麦粒肿”的注意事项：请勿揉搓眼睑或以其他方式给予眼睛刺激。（另外，某些情况下麦粒肿易由体质原因引起，容易在过度疲劳及睡眠不足等体力低下时发生，为避免疲劳请保证充足的睡眠。）

成分、分量

成分	分量	功效
磺胺甲基异恶唑 (抗菌成分)	4.0%	属于长效磺胺类药，对导致结膜炎或麦粒肿的细菌具有抗菌作用。
甘草酸二钾	0.25%	可抑制患部炎症。
牛磺酸	1.0%	激活眼睛的组织代谢。
维生素B ₆	0.1%	激活眼睛的组织代谢。

作为添加物，本品中含有乙二胺四乙酸二钠水合物、羟丙甲纤维素、硼酸、pH调节剂。

<关于成分、分量的注意事项>

使用本药剂滴眼后，有可能口中会感到苦味或甜味。这是主要成分磺胺甲基异恶唑和甘草酸二钾经泪道流入口中所引起的，并非质量问题等异常情况所导致。

保管及使用时的注意事项

- (1) 请置于避光阴凉处保存。
为确保产品不变质，请勿置于车内或取暖器附近等高温处。并且，曾置于高温处的产品可能出现容器变形药水泄漏或药水变质的情况，请勿继续使用。
- (2) 请置于幼儿无法接触到的地方保存。
- (3) 请勿将药水装入其他容器。
(否则有可能导致误用或变质。)
- (4) 请勿与他人共用。
- (5) 为防止药水遇光变质，本产品使用有色容器和有色包装袋，请根据需要放入包装盒等避光处保存。
- (6) 如将本产品置于裤子后袋等处，有可能出现瓶盖松开的情况，敬请注意。
- (7) 请勿使用过期产品。并且，即使在有效期内的产品，也请在开封后尽快用完。

