

免责声明

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。
- 其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由本公司的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，本公司不负任何法律责任。

Sante[®] Medical Antibacterial

⚠ 使用注意事項

❌ 禁止事項

(如不遵守容易使現在的症狀惡化或引發副作用)

請勿長期連續使用。

👤 諮詢事項

1. 以下人員請在使用前諮詢醫生、藥劑師或合格銷售者。
 - (1) 正接受醫生治療的人
 - (2) 曾因藥物等引起過敏症狀的人
 - (3) 有以下症狀的人
劇烈的眼睛疼痛
2. 使用後出現以下症狀時可能是副作用，請立即停止使用，並攜帶本書，諮詢醫生、藥劑師或合格銷售者。

關聯部位	症狀
皮膚	起疹、泛紅、瘙癢
眼睛	充血、瘙癢、腫脹、刺痛


3. 使用3~4天症狀依然未改善時，請停止使用，並攜帶本書，諮詢醫生、藥劑師或合格銷售者。

用法、用量

一次1滴、一日點眼3~5次。

●請遵守以下注意事項。

- (1) 讓小孩使用時，請在保護者的指導監督下使用。
- (2) 容器尖端請勿碰觸到眼睛、眼瞼或睫毛。
- (3) 請勿在佩戴著軟式隱形眼鏡時使用。
- (4) 請只用於點眼。




單次使用包裝

即使開蓋點藥後仍有藥液殘留，也請務必丟棄。

[開啟方式]

請輕輕轉開上蓋，不要硬拉。



適應症

麥粒腫、結膜炎（流行性角結膜炎）、眼瞼炎（眼瞼接觸性皮炎）、眼部瘙癢

有關「麥粒腫」的注意事項：請勿搓揉眼瞼或以其他方式給予眼睛刺激。（另外，某些情形下麥粒腫易由體質因素引起，容易在疲勞過度及睡眠不足等體力下降的時候發生，請避免疲勞並保持充足睡眠。）

成分、含量

成分	含量	作用
磺胺甲基異惡唑 (抗菌成分)	4.0%	持續性磺胺藥劑，具有抵抗造成結膜炎和針眼細菌的抗菌作用。
甘草酸二鉀	0.25%	抑制患部的發炎症狀。
牛磺酸	1.0%	活化眼睛組織的代謝。
維生素B ₆	0.1%	活化眼睛組織的代謝。

作為添加物，含有依地酸鈉水和物、羥丙基甲基纖維素、硼酸、pH值調節劑。

〈成分、容量相關的注意事項〉

使用本藥劑後，偶爾會有覺得嘴裡有苦味或是甜味的情況。

這是由於主成分的磺胺甲基異惡唑以及甘草酸二鉀通過淚道流入口中所導致，並非品質等方面的異常。

保管及操作注意事項

- (1) 請存放在陰涼處，避免陽光直射。為維持產品品質，請勿放置在車上或放置於靠近暖房家電一類的高溫場所。此外，由於有容器變形造成藥液外漏或是藥液品質劣化的疑慮，請勿使用曾置於高溫場所的產品。
- (2) 請存放在幼兒構不到的地方。
- (3) 請勿更換到其他容器。
(可能造成品質改變，或導致誤用。)
- (4) 請勿與其他人共用。
- (5) 為防止光線導致藥液變質，本藥劑使用有色容器、藥袋，但保存時仍請收入藥箱等照不到光的場所保管。
- (6) 若將本產品放置於褲子後側的口袋，有可能造成上蓋開啟，請特別注意。
- (7) 請勿使用已過期的產品。另外，就算是在使用期限內，藥袋一旦開封後仍請盡速使用。

