

## 免责声明

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由本公司临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，本公司概不承担任何责任。

# Sante Medical Plus Active®

## 使用注意事项



### 咨询事项

#### 1、以下人群在服用前请咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

- (1) 正在接受医师治疗的人群
- (2) 因药物等出现过过敏症状的人群
- (3) 拥有以下症状的人群  
眼睛剧烈疼痛
- (4) 接受以下诊断的人群  
青光眼

#### 2、使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时请立即中止使用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

| 相关部位 | 症状          |
|------|-------------|
| 皮肤   | 起疹、发红、发痒    |
| 眼睛   | 充血、发痒、红肿、刺痛 |

#### 3、下述情况时请中止使用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

- (1) 未改善视线模糊时
- (2) 使用5~6天后症状仍无改善时

## 用法及用量

请1次滴1~3滴，1天5~6次。

### ●请遵守以下注意事项。

- (1) 过度使用可能导致异常眩光或充血。
- (2) 儿童使用时请在监护人指导监督下使用。
- (3) 请勿让容器顶端接触到眼睛、眼睑、睫毛（否则眼睫毛、杂菌等混入，有可能导致药液污染或浑浊）。  
液体浑浊时请勿使用。
- (4) 请勿在佩戴软性隐形眼镜的状态下使用。
- (5) 请仅用于滴眼。



## 效能或效果

视线模糊（眼睫毛多时等）、眼睛疲劳、结膜充血、眼睛发痒、眼病预防（游泳后、灰尘或汗液进入眼睛时等）、眼睑炎（眼睑糜烂）、因紫外线等光线引发的眼炎（雪盲等）、佩戴硬性隐形眼镜时的不适感

## 成分及分量

| 成分                 | 分量             | 作用                           |
|--------------------|----------------|------------------------------|
| 维生素A<br>(视黄醇棕榈酸酯)  | 5万单位<br>/100mL | 促进泪液成分（黏蛋白）分泌的同时，稳定泪液，保护角膜。  |
| 硫酸软骨素钠             | 0.5%           | 保护角膜的同时，通过防止泪液蒸发的作用，为眼睛补充水分。 |
| 天然维生素E<br>(生育酚乙酸酯) | 0.05%          | 促进末梢血管的血液循环。                 |
| 牛磺酸                | 0.5%           | 促进眼睛的组织代谢。                   |
| L-天门冬氨酸钾           | 0.5%           | 促进眼睛的组织呼吸。                   |
| 甲硫酸新斯的明            | 0.005%         | 通过改善远近调节功能，缓解眼睛疲劳等。          |
| 马来酸氯苯那敏            | 0.03%          | 阻止组胺发挥作用，抑制眼睛炎症、眼睛发痒。        |
| 氨己酸                | 2.0%           | 抑制导致炎症的物质产生。                 |
| 盐酸四氢唑林             | 0.01%          | 抑制结膜（白眼球部分）充血。               |

本药剂中的添加剂包括乙二胺四乙酸二钠盐二水合物、右旋糖酐、透明质酸钠、羟乙基纤维素、苯扎氯铵溶液、硼酸、氯化蓖麻油聚氧乙烯醚、聚山梨酯-80、二丁基羟甲苯、右旋龙脑、L-薄荷醇、张度剂、pH调节剂。

## 保管及使用注意事项

- (1) 请密闭后保管在避免阳光直射的阴凉场所。为了保持产品质量，请勿放置在车内或靠近暖气等的高温场所。另外，放置在高温场所的本药剂，有可能出现容器变形后药液泄漏或药液变质的情况，因此请勿使用。
- (2) 请保管在儿童无法触及的地方。
- (3) 请不要移至其他容器中。  
(可能会导致误用或变质)。
- (4) 请不要与他人共用。
- (5) 请勿使用超出使用期限的产品。另外，即使在使用期限内，开封后也请尽快使用。
- (6) 根据保存状态，容器的滴眼口周围或盖子内侧有可能沾附白色的成分结晶。此时请用干净纱布轻轻擦拭后使用。

