

免责声明

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由本公司的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，本公司不负任何法律责任。

Sante Medical Plus Active®

使用上的注意事項



諮詢事項

1. 下列的人於使用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

- (1) 正在接受醫師治療的人
- (2) 曾因藥品等，引發過敏症狀的人
- (3) 有下列症狀的人
劇烈的眼睛痛
- (4) 接受過下列診斷的人
青光眼

2. 使用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢
眼睛	充血、發癢、腫脹、刺痛

3. 下列情況下，請停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

- (1) 視力模糊沒有改善的情況下
- (2) 即使使用5~6天，症狀也沒有改善的情況下

用法及用量

1次1~3滴，1天請點眼5~6次。

●請遵守下列注意事項

- (1) 若是過度使用，可能感到異常目眩，或者反而引發充血。
- (2) 使兒童使用的情况下，請在家長的指導監督下使其使用。
- (3) 請勿使容器的頂端接觸眼睛與眼瞼、睫毛（由於混入眼屎或雜菌等污染，藥液可能會被污染或渾濁）。此外，請勿使用混濁者。
- (4) 請勿直接配戴軟式隱形眼鏡使用。
- (5) 請只使用於點眼。



療效或效果

視力模糊（眼多時等）、眼睛疲勞、結膜充血、眼睛癢、預防眼病（游泳之後、灰塵和汗水跑進眼睛時等）、眼瞼炎（眼瞼潰爛）、因紫外線等光線造成的眼炎（雪眼炎等）、佩戴硬式隱形眼鏡時的不適感

成分及分量

成分	份量	作用
維他命A (視黃醇棕櫚酸酯)	5萬單位 /100mL	除了促進淚液成分（黏蛋白）的分泌，還可穩定淚液，保護角膜。
硫酸軟骨素鈉酯	0.5%	保護角膜並透過防止淚液蒸發來滋潤眼睛。
天然型維他命E (d-α-生育酚乙酸酯)	0.05%	改善末梢血液循環。
牛磺酸	0.5%	活化眼部組織新陳代謝。
L-天冬氨酸鉀	0.5%	提高眼睛組織呼吸。
甲硫酸新斯狄格明	0.005%	透過改善遠近焦距調節功能，改善眼睛疲勞等。
氯苯那敏	0.03%	抑制組織胺的作用，抑制眼睛發炎和眼睛癢。
ε-氨基己酸	2.0%	可抑制引起發炎物質的產生。
鹽酸四氫唑啉	0.01%	抑制眼睛結膜（白眼球部分）充血。

添加物含有地氫鈉水合物、葡聚糖、透明質酸鈉、羥乙基纖維素、苯扎氯銨溶液、硼酸、聚氧乙烯氫化蓖麻油、聚山梨醇酯80、BHT、右旋冰片、左旋薄荷醇、等滲劑、pH調節劑。

保管及使用上的注意事項

- (1) 密封後請保存在陰涼處，避免陽光直射。為了保持產品品質，請勿將其放置在高溫的地方，例如車內或暖爐附近。此外，如果放置在高溫的地方，容器可能會變形，藥液可能會洩漏或藥液品質會下降，因此請勿使用。
- (2) 請保管於兒童拿不到的地方。
- (3) 請勿換裝於其他容器。
(可能導致誤用或變質。)
- (4) 請勿與他人共用。
- (5) 請勿使用已過使用期限的產品。此外，即使在使用期限內，開封後也請盡快使用。
- (6) 根據保存狀態，成分晶體可能會在容器的滴管周圍和蓋子內側變白。在這種情況下，請在使用前用乾淨的紗布輕輕擦拭。

