

## 면책사항

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본국 외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 당사에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 당사는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

# Sante Medical Plus Guard® EX

## ⚠ 사용상의 주의

### 상당할 내용

#### 1. 다음에 해당하는 사람은 사용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하시기 바랍니다.

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 사람.
- (2) 약 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.
- (3) 다음의 증상이 있는 사람.  
심한 눈의 통증
- (4) 다음의 진단을 받은 사람.  
녹내장

#### 2. 사용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 사용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하시기 바랍니다.

관련 부위	증상
피부	발진·발적, 가려움
눈	충혈, 가려움, 부음, 눈 쓰라림

#### 3. 다음의 경우에는 사용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하시기 바랍니다.

- (1) 눈의 침침함 증상이 개선되지 않는 경우.
- (2) 5~6일 동안 사용해도 증상이 나아지지 않는 경우.

## 용법·용량

1회 1~3방울, 1일 5~6회 점안합니다.

### ● 다음의 주의사항을 준수하십시오.

- (1) 과도하게 사용하면 비정상적인 눈부심이 생기거나 오히려 충혈을 야기할 수 있습니다.
- (2) 어린이가 사용할 경우에는 보호자의 지도 감독 아래 사용하게 하십시오.
- (3) 용기의 끝 부분이 눈 또는 눈꺼풀, 속눈썹에 닿지 않게 하십시오(눈곱 또는 잡균 등이 혼입되어 약액이 오염 또는 혼탁될 수 있습니다). 또한 혼탁한 것은 사용하지 마십시오.
- (4) 소프트 콘택트 렌즈를 장착한 채로 사용하지 마십시오.
- (5) 점안용으로만 사용하십시오.



## 효능·효과

자외선 및 기타 광선에 의한 안염(설맹 등), 안검염(눈꺼풀 진주름), 눈병 예방(수영 후 먼지나 땀이 눈에 들어갈 때 등), 눈의 피로, 눈의 가려움, 눈의 침침함(눈곱이 많을 때 등), 결막 충혈, 하드 콘택트 렌즈를 장착하고 있을 때의 불편감

## 성분·분량

성분	분량	작용
플라빈아데닌디뉴클레오티드 나트륨(활성형비타민B₂)	0.05%	각막 등 조직 대사를 촉진시켜 회복을 돕습니다.
알란토인	0.3%	염증을 줄이고 각막의 회복을 돕습니다.
콘드로이틴설페이트나트륨	0.5%	각막 보호와 함께 눈물 증발 방지 작용을 통해 눈을 촉촉하게 해줍니다.
타우린	0.5%	눈의 조직 대사를 활성화합니다.
판테놀	0.1%	눈의 조직 대사를 활성화합니다.
L-아스파르트산칼륨	0.5%	눈의 조직 호흡을 증진시킵니다.
네오스티그민메틸황산염	0.005%	초점 조정 기능의 개선 작용을 통해 눈의 피로감 등을 개선합니다.
클로르페니라민말레산염	0.03%	히스타민의 작용을 억제하고 눈의 염증과 가려움증을 억제합니다.
글리시리진산디칼륨	0.25%	눈의 염증을 억제합니다.
테트라히드로졸린염산염	0.01%	결막(흰자위 부위)의 충혈을 억제합니다.

첨가물로서 임시론아미노카프론산, 에데트산나트륨수화물, 클로로부탄올, 게라니올, 맥스트란, 히알루론산나트륨, 히드록시에틸셀룰로오스, 벤잘코늄염화물, 폴리소르베이트80, d-보르네올, L-멘톨, 등장화제, pH조정제를 포함하고 있습니다.

### <성분 및 분량에 관한 주의>

본제는 점안 후 때때로 입 속에서 단맛이 느껴지는 경우가 있습니다. 이것은 성분 중 하나인 글리시리진산디칼륨이 눈물길을 통해 입 속으로 흘러들어오면서 발생하는 것으로 품질 등의 이상으로 인한 것이 아닙니다.

### 보관 및 취급상의 주의

- (1) 직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오. 제품의 품질을 유지하기 위해 자동차 내부나 난방기구 근처와 같은 고온의 장소에 방치하지 마십시오. 또한 고온의 장소에 방치한 제품은 용기가 변형되어 내용액이 새거나 품질이 저하될 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- (2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- (3) 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오.  
(오용의 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다.)
- (4) 다른 사람과 공유하지 마십시오.
- (5) 사용 기한을 초과한 제품은 사용하지 마십시오. 또한 개봉 후에는 사용 기한 중이더라도 가능한 한 빨리 사용하십시오.
- (6) 보존 상태에 따라 성분 내 결정이 용기의 점안구 주변 또는 뚜껑 내측에 노랗게 부착될 수 있습니다. 이 경우 깨끗한 거즈로 가볍게 닦아낸 후 사용하십시오.
- (7) 본제의 노란색은 플라빈아데닌디뉴클레오티드나트륨(활성형비타민B₂)에 의한 것입니다. 점안 시 내용액이 흘러 셔츠 등에 착색된 경우는 즉시 물로 씻으십시오.

