

免责声明

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保持相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由本公司的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，本公司不负任何法律责任。

Sante Medical Plus Guard® EX

使用上的注意事項



諮詢事項

1. 下列的人於使用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

- (1) 正在接受醫師治療的人
- (2) 曾因藥品等，引發過敏症狀的人
- (3) 有下列症狀的人
劇烈的眼睛痛
- (4) 接受過下列診斷的人
青光眼

2. 使用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢
眼睛	充血、發癢、腫脹、刺痛

3. 下列情況下，請停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

- (1) 視力模糊沒有改善的情況下
- (2) 即使使用5~6天，症狀也沒有改善的情況下

用法及用量

1次1~3滴，1天請點眼5~6次。

●請遵守下列注意事項

- (1) 若是過度使用，可能感到異常目眩，或者反而引發充血。
- (2) 使兒童使用的情况下，請在家長的指導監督下使其使用。
- (3) 請勿使容器的頂端接觸眼睛與眼瞼、睫毛（由於混入眼屎或雜菌等污染，藥液可能會被污染或渾濁）。此外，請勿使用混濁者。
- (4) 請勿直接配戴軟式隱形眼鏡使用。
- (5) 請只使用於點眼。



療效或效果

因紫外線等光線造成的眼炎（雪眼炎等）、眼瞼炎（眼瞼潰爛）、預防眼病（游泳之後、灰塵和汗水跑進眼睛時等）、眼睛疲勞、眼睛癢、視力模糊（眼屎多時等）、結膜充血、佩戴硬式隱形眼鏡時的不適感

成分及分量

成分	份量	作用
黃素腺嘌呤二核苷酸鈉（活性維他命B ₂ ）	0.05%	促進角膜等組織新陳代謝並促進角膜修復等。
尿囊素	0.3%	可以減少發炎並促進角膜修復。
硫酸軟骨素鈉酯	0.5%	保護角膜並透過防止淚液蒸發來滋潤眼睛。
牛磺酸	0.5%	活化眼部組織新陳代謝。
泛醇	0.1%	活化眼部組織新陳代謝。
L-天冬氨酸鉀	0.5%	提高眼睛組織呼吸。
甲硫酸新斯狄格明	0.005%	透過改善調節焦距功能，改善眼睛疲勞等。
氯苯那敏	0.03%	抑制組織胺的作用，抑制眼睛發炎和眼睛癢。
甘草酸二鉀	0.25%	抑制眼睛發炎。
鹽酸四氫唑啉	0.01%	抑制眼睛結膜（白眼球部分）充血。

添加物含有ε-氨基己酸、依地酸鈉水合物、三氯丁醇、香葉醇、葡聚醣、透明質酸鈉、羥乙基纖維素、苯扎氯銨溶液、聚山梨醇酯80、右旋冰片、左旋薄荷醇、等滲劑、pH調節劑。

〈成分及分量相關的注意事項〉

眼睛滴入本劑後，您有時可能會感到口中有甜味。這是由於成分之一的甘草酸二鉀透過淚管流出進入口腔所致，並非品質等異常所致。

保管及使用上的注意事項

- (1) 密封後請保存在陰涼處，避免陽光直射。為了保持產品品質，請勿將其放置在高溫的地方，例如車內或暖爐附近。此外，如果放置在高溫的地方，容器可能會變形，藥液可能會洩漏或藥液品質會下降，因此請勿使用。
- (2) 請保管於兒童拿不到的地方。
- (3) 請勿換裝於其他容器。
(可能導致誤用或變質。)
- (4) 請勿與他人共用。
- (5) 請勿使用已過使用期限的產品。此外，即使在使用期限內，開封後也請盡快使用。
- (6) 根據保存狀態，成分晶體可能會在容器的滴管周圍和蓋子內側變黃。在這種情況下，請在使用前用乾淨的紗布輕輕擦拭。
- (7) 本劑的黃色為黃素腺嘌呤二核苷酸鈉（活性維他命B₂）的顏色。如果在點眼藥時藥物溢出並弄髒了襯衫等時，請立即用水清洗。

