



한국산텐제약(주) 타리비드점안액 및 타리비드안연고의 허가사항 변경 안내문

- 1) 한국산텐제약(주) 제품을 이용해 주시는 고객 여러분의 무궁한 발전을 기원합니다.
 2) 식품의약품안전처의 허가사항 변경지시[의약품관리과-7777 (2021.10.13)]에 따라, 타리비드점안액 및 타리비드안연고의 허가사항(용법·용량)이 아래와 같이 변경되었습니다. (허가사항 변경 반영일자 : 2021.11.15)
 3) 본 제품 및 본 변경에 관한 문의사항은 한국산텐제약(주)(대표전화 : 1522-1430, 홈페이지 : www.santen.co.kr)으로 연락 주시기 바랍니다.

품 목	기 허가사항	변경사항
타리비드점안액(오픈플러사신)	<p>■용법·용량</p> <p>1회 1방울 1일 3회 점안(도포)합니다.</p> <p>증상에 따라 적절히 증감합니다.</p> <p>수술후 감염증 : 수술전 2일간 1일 5회 점안, 수술 당일에는 수술의 시각, 수술의 종류에 따라 적의 점안하고 수술 직후에 1회 점안, 이후는 포대교환시 매회 점안합니다.</p>	<p>■용법·용량</p> <p>1회 1방울 1일 3회 점안(도포)합니다.</p> <p>증상에 따라 적절히 증감합니다.</p> <p><삭제></p>
타리비드안연고(오픈플러사신)	<p>■용법·용량</p> <p>1일 3회 점안(도포)하십시오.</p> <p>증상에 따라 적절히 증감하십시오.</p> <p>수술 후 감염증 : 수술 전 2일간 1일 5회 점안, 수술 당일에는 수술의 시각, 수술의 종류에 따라 적의 점안하고 수술 직후에 1회 점안, 이후는 포대교환시 매회 점안하십시오.</p>	<p>■용법·용량</p> <p>1일 3회 점안(도포)하십시오.</p> <p>증상에 따라 적절히 증감하십시오.</p> <p><삭제></p>