



한국산텐제약(주) 트루숍 점안액의 허가사항 변경 안내문

- 1) 한국산텐제약(주) 제품을 이용해 주시는 고객 여러분의 무궁한 발전을 기원합니다.
- 2) 식품의약품안전처의 허가사항 변경명령[의약품안전평가과 - 853(2023.02.08)]에 따라, 도르졸라미드 단일제(트루숍 점안액) 허가사항(용법·용량)이 아래와 같이 변경되었습니다. (허가사항 변경 반영일자 : 2023.03.08)
- 3) 본 제품 및 본 변경에 관한 문의사항은 한국산텐제약(주)(대표전화 : 1522-1430, 홈페이지 : www.santen.co.kr)으로 연락 주시기 바랍니다.

구분	기 허가사항	변경사항
용법용량	<ol style="list-style-type: none"> 1. 점안용 베타차단제와 병용 시 : 1회 1방울 1일 2회 점안한다. 2. 단독투여 시 : 1회 1방울 1일 3회 점안한다. 3. 다른 안과용 녹내장치료제의 대체사용시 일일투여량 투여후 기존 약물 투여를 중단하고 다음날 이 약 투여를 시작한다. 4. 다수의 점안제 병용시 : 각 점안액을 최소 10분 간격으로 투여한다. <p>〈산실〉</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 점안용 베타차단제와 병용 시 : 1회 1방울 1일 2회 점안한다. 2. 단독투여 시 : 1회 1방울 1일 3회 점안한다. 3. 다른 안과용 녹내장치료제의 대체사용시 일일투여량 투여후 기존 약물 투여를 중단하고 다음날 이 약 투여를 시작한다. 4. 다수의 점안제 병용시 : 각 점안액을 최소 10분 간격으로 투여한다. <p><u>약 2분간 비루관을 막거나 눈을 감고 있으면 이 약의 전신 흡수가 줄어들어 전신 부작용을 줄이고, 투여 부위에서의 국소적 효과를 높일 수 있다.</u></p>