

수입의약품

# 하이아레인® 0.3 점안액

(히알루론산나트륨)

Hyalein®0.3 ophthalmic solution

전문의약품

Santen

#### ■ 원료약품 및 그 분량

이 약 1mL 중

유효성분 : 히알루론산나트륨(JP) ..... 3mg  
보조제 : 클로르헥시딘글루코사민 액(JP) ..... 0.05325mg  
(클로르헥시딘글루코신염으로서 ..... 0.01mg)  
첨가제 : 염화나트륨, 프로필렌글리콜, 아미노카프로산, 에데트산나트륨수화물, 수산화나트륨,  
물을 염산, 정제수

■ 성상 : 무색투명한 플라스틱용기에 무색투명하고 점조성이 있는 액이 든 점안제

#### ■ 효능 · 효과

다음 질환에 의한 각결막 삼피장 :

- 소그伦증후군, 파부점막이증후군(스티븐스-존슨증후군), 건성안증후군과 같은 내인성 질환
- 수술 후, 악세스, 외상, 쿠테트렌즈 착용 등에 의한 외인성 질환

#### ■ 용법 · 용량

1회 1방울, 1일 5~6회 점안합니다. 증상에 따라 적절히 증강합니다.

보통 0.1% 제제를 투여하고, 중증 칠환 등에서 효과가 불충분한 경우에는 0.3% 제제를 투여합니다.

#### ■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

이 약의 구성성분 및 단백질계 약물에 과민반응 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.

#### 3. 이상반응

1) 눈 : 때때로 안검 소양감(눈가풀기 가려움), 눈지극감, 결막염, 충혈, 결막충혈, 미만성 표층각

막염 등의 각막장애, 이물감 등이 나타날 수 있고, 드물게 알지(눈屎), 앙구통증이 나타나는 경우가 있습니다. 이러한 증상이 나타남 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 합니다.

2) 과민반응 : 때때로 안검염, 안검피부염이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.

3) 국내 시판후조사결과 다음 병용약제 투여시의 이상반응 발현율이 병용약제를 투여하지 않았을 경우보다 유의하게 높게 나타났습니다.

- 스테로이드제(corticosteroids), 앙구건조치료제(dry eye preparations), 항균제(anti-infectives), 녹내장제제(glaucoma preparations), 항알레르기제제(anti-allergy), 백내장제제(cataract preparations), 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs),

스테로이드+항균제(antiseptics with corticosteroids)

4) 외국에서 승인시까지의 조사 및 사용성적 조사의 총 중례 4,208례 중 이상반응이 확인된 것은 74례(1.76%)였습니다. 주된 이상반응은 안검 가려움 19례(0.45%), 눈 지극감 15례(0.36%), 결막 충혈 10건(0.24%), 안검염 7건(0.17%) 등 이었습니다. 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 합니다.

#### 4. 상호작용

이 약은 다른 점안제와 동시에 사용하지 않도록 합니다. 함께 사용할 경우에는 다른 점안제를 사용하고 약 30분 후에 이 약을 점안합니다.

#### 5. 적용상의 주의

1) 이 약은 점안용으로만 사용합니다.

2) 용기의 끝이 눈꺼풀 및 속눈썹에 닿으면 눈곱이나 진균 등에 의해 악액이 오염 또는 혼탁될 수 있으므로 주의합니다. 또한 혼탁된 것은 사용하지 않습니다.

3) 오염을 방지하기 위해 될 수 있는 한 공동으로 사용하지 않습니다.

4) 개봉 후 1개월이 지난 경우 남은 액을 사용하지 않습니다.

#### ■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

■ 포장단위 : 5mL/병

#### ■ 사용기한 : 본 제품의 사용기한은 직접용기 혹은 외부포장에 기재되어 있습니다.

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환해 드립니다.

※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

※ 이 첨부문서 작성일자 이후 개정된 내용은 홈페이지([www.santen.co.kr](http://www.santen.co.kr))나 전화로 문의하시면 확인할 수 있습니다.

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원 (1644-6223)

제조원

SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Noto Plant : 2-14, Shikinami, Hodatsushimizu-cho, Hakui-gun, Ishikawa, Japan

수입판매원

한국산텐제약(주)

서울 강남구 테헤란로 203, 15층 (역삼동, 에스아이타워) (TEL : 1522-1430)

3HT · KRS

06

※ 첨부문서작성일 : 2021년 7월 1일