



# 타리비드® 안연고

(오픈록사신)

Tarivid® ophthalmic ointment



전문의약품

### ■ 원료약품 및 그 분량

이 약 1g 중  
유효성분 : 오픈록사신(JP)..... 3mg  
첨가제 : 정제라놀린, 유동파라핀, 백색바셀린

■ **성상** : 알루미늄 튜브에 든 연한 노란색의 안연고제

### ■ 효능·효과

(유효균종)  
본제 감수성의 포도구균속, 연쇄상구균속, 폐렴구균, 장구균속, 소구균속, 모락셀라속, 간균속, 클렙시엘라속, 세라티아속, 프로테우스속, 모르겔라 모르겔라, 프로비덴시아속, 혐호균속(인플루엔자균, 헤모필루스 애집티우스(Koch-Weeks bacillus), 슈도모나스속, 녹농균, 벡톨데리아 세피리스, 스테노트로포모나스(산토모나스)말도필리아, 아시네토박터속, 프로피오니박테리움아크네스, 트라코마 클라미디아(클라미디아 트라코마티스)  
(적응종)  
안검염, 누낭염, 맥립종, 결막염, 검판선염, 각막염(각막궤양을 포함), 안과 수술 전후의 무균화 요법

### ■ 용법·용량

1일 3회 점안(도포)하십시오.  
증상에 따라 적절히 증감하십시오.

### ■ 사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.  
이 약 및 퀴놀론계 항생물질에 과민증 병력이 있는 환자
- 부작용
  - 속 : 드물게 속양 증상(구역, 사지냉감, 호흡곤란 등)이 나타날 수 있으므로 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.
  - 과민증 : 드물게 심혈관계 허탈, 의식소실, 혈관 부종(인두, 후두, 얼굴), 기도폐쇄, 호흡곤란, 발진, 두드러기, 가려움증, 안검발적·부종, 피부발적, 결막충혈 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하십시오.
  - 눈 : 때때로 일시적인 잔열감 등 자극감, 불쾌감이, 때때로 자통, 발적, 소양감, 화학적 결막염 및 각막염, 안구주위 및 안면 부종, 이물감, 눈부심, 시력불선명, 눈물, 건조감, 안통, 드물게 어지러움, 비만성 표층각막염 등의 각막장애 및 독성표피괴사로까지 악화되는 스티븐스-존슨 증후군이 일어날 수 있으므로 이런 증상이 나타나는 경우 투여를 중지하십시오.
  - 기타 : 청각장애, 때때로 자극증상이 일어나는 경우가 있습니다.
- 일반적 주의
  - 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현 등을 방지하기 위하여 원칙적으로 감수성을 확인하고 치료상 필요한 최소 기간만 투여하십시오.
  - 이 약의 장기 사용은 진균을 비롯한 비감수성균의 과잉 성장을 초래할 수 있으므로 장기 사용하지 마십시오. 중독 감역시 투여를 중지하고 다른 요법으로 대체하십시오.
  - 트라코마의 경우에는 8주간 투여를 표준으로 하고, 이후의 계속적인 투여에 대해서는 신중 하 하십시오.
- 임부 및 수유부에 대한 투여
  - 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.
  - 수유부에 투여할 경우에는 수유를 중단하거나 이 약의 투여를 중지하십시오.
- 소아에 대한 투여  
1세 미만의 영아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않습니다.
- 적응상의 주의
  - 접안용으로만 사용하십시오.
  - 접안시 용기의 입구가 직접 눈에 닿지 않도록 주의하십시오.
  - 오염을 방지하기 위해 될 수 있는 한 공동으로 사용하지 마십시오.
- 저장상의 주의사항
  - 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
  - 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
  - 오염을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

■ **저장방법** : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ **포장단위** : 3.5g/튜브

■ **사용기한** : 본 제품의 사용기한은 직접용기 혹은 외부포장에 기재되어 있습니다.

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환해 드립니다.  
※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.  
※ 이 첨부문서 작성일자 이후 개정된 내용은 홈페이지(www.santen.co.kr)나 전화로 문의하시면 확인할 수 있습니다.  
※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원 (1644-6223)

## 제조원 SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Shiga plant : 348-3, Aza-suwa, Oaza-shide, Taga-cho, Inukami-gun, Shiga, Japan

제휴원  
DAIICHI SANKYO CO., LTD.  
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo, Japan

수입판매원  
**한국산텐제약(주)** TRN · KRS  
서울 강남구 테헤란로 203, 15층 (역삼동, 에스아이타워) (TEL : 1522-1430) 04

※ 첨부문서작성일 : 2021년 12월 1일