

수입의약품

산텐 가리유니[®] 점안액 (피레녹신)

Santen Kary Uni[®] ophthalmic suspension



000572

전문의약품

■ 원료약품 및 그 분량

이 약 1mL 중
유효성분 : 피레녹신(JP)..... 0.05mg
보존제 : 벤질코늄염화물(JP)..... 0.05mg
첨가제 : 농글리세린, 폴리옥시에틸렌경화피마자유 60, 에데트산나트륨수화물, 묽은염산, 수산화나트륨, 정제수

■ **성상** : 옐로우색의 현탁액이 밝은 주황색의 투명한 플라스틱용기에 든 점안제

■ **효능·효과**
초기 노인성 백내장

■ **용법·용량**
사용시 흔들어 섞은 후 1회 1~2방울 1일 3~5회 점안합니다.
증상에 따라 적절히 증감합니다.

■ 사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
눈의 염증이나 상처가 있는 환자
- 이상반응
 - 눈 : 미만성 표층각막염, 결막충혈, 자극감, 가려움 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지합니다.
 - 과민반응 : 안검염, 접촉피부염 등이 일어날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지합니다.
- 일반적 주의
이 약은 의사나 약사의 지시 하에 사용합니다.
- 적용상의 주의
 - 이 약은 점안용으로만 사용합니다.
 - 점안시 용기의 입구가 직접 눈에 닿지 않도록 주의합니다.
 - 오염을 방지하기 위해 될 수 있는 한 공동으로 사용하지 않습니다.
 - 개봉 후 3주 이내에 사용합니다.
- 저장상의 주의사항
 - 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
 - 오용을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.
- 기타
 - 이 약은 금속 이온 흡입시는 색상이 변화되므로 주의합니다.
 - 이 약은 보관방법에 따라 흔들어 섞어도 입자분산이 어려운 경우가 있기 때문에, 보관시에는 항상 안약병을 바로 세워서 보관합니다.

■ **저장방법** : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ **포장단위** : 5mL/병

■ **사용기한** : 본 제품의 사용기한은 직접용기 혹은 외부포장에 기재되어 있습니다.

- ※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
- ※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
- ※ 이 첨부문서 작성일자 이후 개정된 내용은 홈페이지(www.santen.com/kr)나 전화로 문의하시면 확인할 수 있습니다.
- ※ 부작용 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원 (1644-6223)

제조사 SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Noto Plant : 2-14, Shikinami, Hodatsushimizu-cho, Hakui-gun, Ishikawa, Japan (주성분 멸균 외 전공정)

Japan Irradiation Service Co., LTD

2600, Ishigamitokujuku, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki, Japan (주성분 멸균)

수입판매원 한국산텐제약(주)

서울 강남구 테헤란로 203, 15층 (역삼동, 에스아타워) (TEL : 1522-1430) 05

※ 첨부문서작성일 : 2024년 9월 20일

KRU · KRS

参天製薬	
品名 カリ-ユニ点眼液 (韓国参天) 添付文書	
Glams No.CAW-4824-02	
部 品 本 体 表	
寸法	254 × 110
版式	オフ
出力	5枚
使用色 : 紺	
製 作 凸版印刷	
文字 新規 西居 06.10.07	
753561 韓国参天 05	