



本說明書請與藥劑一同保管，
使用時請仔細閱讀。

Santen

Made in Japan

緩解眼睛乾澀，配戴隱形眼鏡時的不適感

參天柔潤® 人工淚液點眼液

[人工淚液型眼藥水]

Soft Santear®

衛部藥輸字第027589號

醫師藥師藥劑生指示藥品

Soft Santear 是質地與淚液接近的人工淚液，能溫和滋潤淚液分泌不足時的乾澀雙眼及緩解配戴隱形眼鏡時引起的異物感等不適症狀。我們的眼睛每天處於空汙及廢氣的現代生活環境中，容易有眼睛異物感、不適感等問題。當風沙、毛屑等異物進入眼睛時，眼睛會發揮清潔的能力分泌淚液。此時也可以使用 Soft Santear 輔助淚液，將外來異物排出。

但請注意！因本產品不含防腐劑，請務必於開封 10 天內使用完畢，未使用完之藥液請勿繼續使用。

若診斷為乾眼症者，請定期接受眼科的診療。

成分 / 含量

成分	含量	作用
Potassium Chloride	0.1%	沖洗眼部
Sodium Chloride	0.4%	沖洗眼部

含有下述添加劑：硼酸 (Boric Acid)、pH 調整劑 (Sodium Hydroxide)、純水 (Purified Water)。

用途 (適應症)

暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感。暫時緩解因配戴隱形眼鏡造成之不適。

使用上注意事項

1. 有下列情形者，請勿使用：
曾因本藥成分引起過敏的人。
2. 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
正在接受醫師治療或醫師處方眼藥的人。
3. 其他使用上注意事項：
 - (1) 為防止兒童誤食請妥善保管。
 - (2) 避免陽光直射。
 - (3) 使用前，請洗淨雙手。
 - (4) 請依照藥品標示使用。
 - (5) 以下情形，請勿繼續使用：
 1. 超過保存期限的眼藥水。
 2. 開瓶 10 天後。
 3. 藥液混濁、變色或出現異物時。
 - (6) 為避免污染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口，並避免與他人共用，或以其他容器盛裝。
 - (7) 尚未開始使用前，請勿將瓶蓋旋緊。
 - (8) 請避開日光直射處，拴緊後保管於陰涼場所。請勿置於汽車內或暖氣器具附近等高溫場所，以確保產品品質。放置於高溫場所時，容器可能會因為變形而造成藥水滲漏或品質劣化，所以請勿使用。
 - (9) 請勿更換至其他容器。(有可能造成誤用或變質。)
 - (10) 可能會因保存狀態的不同，在容器點眼藥口周圍產生成分結晶或是在瓶蓋內有白色附著物。此時請使用乾淨的紗布輕輕擦拭。

接背合

用法 / 用量

需要時使用	每次 1 至 2 滴
-------	------------

警語

1. 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

發生部位	症 狀
皮膚	發疹 / 發紅、搔癢
眼睛	充血、搔癢、浮腫

2. 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (1) 連續使用三天（或 72 小時）症狀沒有改善。
- (2) 使用後產生眼睛劇痛、持續視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。
- (3) 若有任何不適情況產生。
- (4) 發生過敏反應。

製劑性狀

pH	7.0 ~ 8.0
滲透壓比	0.90 ~ 1.20
性狀	無色透明、無菌水性眼藥水

開封方法

瓶蓋轉緊至
頂到瓶身後



原密封的眼藥水
瓶口就會有開口。



包 裝：100 毫升以下 PE 塑膠瓶裝

儲存條件：25°C 以下儲存



製造商 参天製藥株式会社

<https://www.santen.com.tw>

藥 商 台灣參天製藥股份有限公司

台北市中山區松江路126號9樓之1

製造廠 SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. (NOTO PLANT)

2-14, Shikinami, Hodatsushimizu-cho, Hakui-gun, Ishikawa, Japan.

消費者服務熱線 0800-020-580