

本說明書請與藥劑一同保管，
使用時請仔細閱讀。

Santen

Made in Japan

有效緩解因年齡 / 乾澀等造成的眼睛疲勞

參天極滴晰睛® 眼藥水 [眼科藥]

Sante Medical Active

衛部藥輸字第027567號 醫師藥師藥劑生指示藥品

隨著年齡增長，眼睛調節焦距功能逐漸降低，且淚液分泌量減少，造成眼睛容易乾澀等。眼睛功能逐漸衰退的情況下，若過度使用眼睛，可能會造成眼睛疲勞及模糊等的問題增加。

Sante Medical Active 含有促進淚液（黏蛋白 Mucin）分泌的成份，使淚液穩定分泌的維他命 A（Retinol Palmitate）、保護眼睛表面，保持其濕潤的軟骨素硫酸鈉（Sodium Chondroitin Sulfate）、緩解調焦眼肌（睫狀肌）緊繃的 Neostigmine Methylsulfate 等 5 種最高濃度*¹ 的成分，另還有緩解眼睛代謝的牛磺酸（Taurine）、L-Potassium Aspartate 幫助疲勞眼睛恢復。為 9 種有效成分均衡調製的完美配方。能有效舒緩因眼睛功能衰退等引起的眼睛疲勞 / 模糊。提供努力為生活而奮鬥的人們，眼睛健康舒適的生活。

*¹ 配方含量為台灣指示藥品審查基準眼用製劑成分的最大濃度維他命 A（Retinol Palmitate）、Sodium Chondroitin Sulfate、維生素 E（d- α -Tocopherol Acetate）、Neostigmine Methylsulfate、Chlorpheniramine Maleate

成分 / 有效成分及含量

成分	含量	作用
維生素 A（Retinol Palmitate）	500單位/ mL	眼睛疲勞
軟骨素硫酸鈉 （Sodium Chondroitin Sulfate）	5mg/ mL	眼睛疲勞
天然型維生素 E（Naturally Occurring Vitamin E （- α -tocopherol acetate）d- α - Tocopherol Acetate）	0.5mg/ mL	眼睛疲勞
牛磺酸（Taurine）	5mg/ mL	眼睛疲勞
L-Potassium Aspartate	5mg/ mL	眼睛疲勞
Neostigmine Methylsulfate	0.05mg/ mL	—
Chlorpheniramine Maleate	0.3mg/ mL	眼睛癢
ϵ -Aminocaproic Acid	10mg/ mL	暫時緩解因輕微眼部刺激所引起 之不適
Tetrahydrozoline Hydrochloride	0.1mg/ mL	暫時緩解因輕微眼部刺激所引起 之不適、或眼睛紅

其他成分（賦形劑）：Disodium Edetate Hydrate、Dibutylhydroxytoluene、聚葡萄糖 70（Dextran70）、玻尿酸（Purified Sodium Hyaluronate）、羥乙基纖維素（Hydroxyethyl Cellulose）、氯化苯二甲煙銨液（Benzalkonium Chloride Solution）、硼酸（Boric Acid）、Polyoxyethylene Hydrogenated Castor Oil 60、油酸聚醇山梨酯（Polysorbate 80）、d-龍腦（d-Borneol）、l-薄荷腦（l-Menthol）、等張劑（Propylene Glycol）、pH 調節劑（Sodium Hydroxide, Dilute Hydrochloric Acid）、純水（Purified Water）。

用途（適應症）

暫時緩解因輕微眼部刺激所引起之不適、或眼睛紅，眼睛癢，眼睛疲勞。

接背面

使用上注意事項

1. 有下列情形者，請勿使用：
曾因本藥成分引起過敏的人。
2. 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
正在接受醫師治療或醫師處方眼藥的人。
3. 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
青光眼的人。
4. 其他使用上注意事項：
 - (1) 為防止兒童誤食請妥善保管。
 - (2) 避免陽光直射。
 - (3) 使用前，請洗淨雙手。
 - (4) 請依照藥品標示使用。
 - (5) 以下情形，請勿繼續使用：
 1. 超過保存期限的眼藥水。
 2. 開瓶 28 天後。
 3. 藥液混濁、變色或出現異物時。
 - (6) 為避免污染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口，並避免與他人共用，或以其他容器盛裝。
 - (7) 如需同時使用兩種以上眼藥時，請依下列方式使用，以免影響藥效：
 1. 使用眼藥水與眼藥膏時，請先使用藥水，間隔 10 分鐘以上再用藥膏。
 2. 使用兩種眼藥水時，建議間隔 5 分鐘以上。
 - (8) 配戴隱形眼鏡時，請勿使用含防腐劑及含懸浮液之眼藥水。
 - (9) 過度使用會增加眼睛紅腫。
 - (10) 可能會因保存狀態的不同，在容器點眼藥口周圍產生成分結晶或是在瓶蓋內有白色附著物。此時請使用乾淨的紗布輕輕擦拭。



用法用量

一天 3 至 4 次 每次 1 至 2 滴

警 語

1. 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

發生部位	症 狀
皮 膚	發疹 / 發紅、搔癢
眼 睛	充血、搔癢、浮腫、刺痛

2. 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
 - (1) 連續使用三天（或 72 小時）症狀沒有改善。
 - (2) 使用後產生眼睛劇痛、持續視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。
 - (3) 若有任何不適情況產生。
 - (4) 發生過敏反應。

包 裝

100 毫升以下 PET 塑膠瓶裝

儲存條件

25°C 以下儲存



製造商 参天製藥株式会社
<https://www.santen.com.tw>

藥 商 台灣參天製藥股份有限公司
台北市中山區松江路126號9樓之1

製造廠 **SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. (NOTO PLANT)**
2-14, Shikinami, Hodatsushimizu-cho, Haku-gun, Ishikawa, Japan.
諮詢專線 0800-020-580

01

0 2 9 0