

本說明書請與藥劑一同保管，
使用時請仔細閱讀。

Santen

緩解眼睛搔癢、眼睛疲勞 參天金潤修護[®]眼藥水

Sante 40 Gold[®]

衛部藥輸字第026970號

一般來說，過度使用眼睛或隨著年齡的增長均容易使眼睛產生搔癢或疲勞的症狀，且不容易恢復。對於容易產生搔癢及疲勞等症狀的眼睛，補充維生素等營養成分的保養非常重要。

Sante 40 Gold 眼藥水的配方成分中含有營養成分（維生素 / 氨基酸）及軟骨素硫酸鈉 (Sodium Chondroitin Sulfate) 成分，對眼睛搔癢及疲勞有效。

成分 / 有效成分及含量

成分	含量	作用
Neostigmine Methylsulfate	0.005%	—
Naturally Occurring Vitamin E (d- α -tocopherol Acetate)	0.05%	眼睛疲勞
Taurine	0.5%	眼睛疲勞
Panthenol	0.05%	眼睛疲勞
Sodium Chondroitin Sulfate	0.5%	眼睛疲勞
Chlorpheniramine Maleate	0.03%	眼睛癢


其他成分（賦形劑）：氨基己酸（ ϵ -Aminocaproic Acid）、Disodium Edetate Hydrate、氯丁醇（Chlorobutanol）、香葉醇（Geraniol）、葡萄糖聚糖（Dextran 70）、羥乙基纖維素（Hydroxyethyl Cellulose）、氯化苯二甲烴銨（Benzalkonium Chloride Solution）、Polyoxyethylene Hydrogenated Caster Oil 60、聚山梨醇酯 80（Polysorbate 80）、d-龍腦（d-Borneol）、l-薄荷腦（l-Menthol）、等張劑（Sodium Chloride）、pH 調節劑（Dilute Hydrochloric Acid, Sodium Hydroxide）、純水（Purified Water）。

用途(適應症)

眼睛癢，眼睛疲勞。

使用上注意事項

1. 有下列情形者，請勿使用：
曾因本藥成分引起過敏的人。
2. 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
正在接受醫師治療或醫師處方眼藥的人。
3. 其他使用上注意事項：
(1) 為防止兒童誤食請妥善保管。
(2) 避免陽光直射。
(3) 使用前，請洗淨雙手。
(4) 請依照藥品標示使用。



接背面

(5) 以下情形，請勿繼續使用。

1. 超過保存期限的眼藥水。
2. 開瓶 28 天後。
3. 藥液混濁、變色或出現異物時。

(6) 為避免污染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口，並避免與他人共用，或以其他容器盛裝。



(7) 如需同時使用兩種以上眼藥時，請依下列方式使用，以免影響藥效：

1. 使用眼藥水與眼藥膏時，請先使用藥水，間隔 10 分鐘以上再用藥膏。
2. 使用兩種眼藥水時，建議間隔 5 分鐘以上。

(8) 配戴隱形眼鏡時，請勿使用含防腐劑及含懸浮液之眼藥水。

(9) 兒童使用時，請在監護人的指導監督下使用。

(10) 僅限使用於點眼用途。

(11) 可能會因保存狀態的不同，在容器點眼藥口周圍產生成分結晶或是在瓶蓋內有白色附著物。此時請使用乾淨的紗布輕輕擦拭。

用法用量

一天 3 至 4 次 每次 1 至 2 滴

醫師藥師藥劑生指示藥品

警 語

1. 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

發生部位	症 狀
皮 膚	發疹 / 發紅、搔癢
眼 睛	充血、搔癢、浮腫、刺痛

2. 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (1) 連續使用三天（或 72 小時）症狀沒有改善。
- (2) 使用後產生眼睛劇痛、持續視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。
- (3) 若有任何不適情況產生。
- (4) 發生過敏反應。

包 裝

100 毫升以下塑膠瓶裝

儲存條件

25°C 以下儲存



製造商 参天製藥株式会社
<https://www.santen.com.tw>

藥 商 台灣參天製藥股份有限公司
台北市中山區松江路126號9樓之1

製造廠 **SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. (NOTO PLANT)**
2-14, Shikinami, Hodatsushimizu-cho, Hakui-gun, Ishikawa, Japan.
消費者服務熱線 0800-020-580

02

0531