

本說明書請與藥劑一同保管，
使用時請仔細閱讀。

Santen



用於眼睛疲勞、眼睛紅 參天 清涼眼藥水®

Sante FX Neo®

衛署藥輸字第025769號

醫師藥師藥劑生指示藥品

眼睛疲勞常起因於眼睛負擔過重。
Sante FX Neo，可緩解眼睛疲勞和眼睛紅。

成分 / 有效成分及含量

成分	含量	作用
Neostigmine Methylsulfate	0.005%	—
Taurine	1.0%	緩解眼睛疲勞
Potassium L-Aspartate	1.0%	緩解眼睛疲勞
Tetrahydrozoline Hydrochloride	0.05%	暫時緩解因輕微眼部刺激所引起之不適、或眼睛紅
Chlorpheniramine Maleate	0.03%	抑制組織胺的作用，緩解眼睛癢
ϵ -Aminocaproic acid	1.0%	暫時緩解因輕微眼部刺激所引起之不適

其他成分（賦形劑）：氯丁醇（Chlorobutanol）、氯化苯二甲煙銨（Benzalkonium Chloride）、硼酸（Boric acid）、d-龍腦（d-Borneol）、dl-樟腦（dl-Camphor）、l-薄荷腦（l-Menthol）、pH調節劑（Dilute Hydrochloric Acid, Sodium Hydroxide）、純水（Purified Water）。

用途（適應症）

暫時緩解因輕微眼部刺激所引起之不適、或眼睛紅，眼睛癢，眼睛疲勞。

使用上注意事項

- 有下列情形者，請勿使用：
曾因本藥成分引起過敏的人。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
正在接受醫師治療或醫師處方眼藥的人。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
青光眼的人。
- 其他使用上注意事項：
 - 為防止兒童誤食請妥善保管。
 - 避免陽光直射。
 - 使用前，請洗淨雙手。
 - 請依照藥品標示使用。
 - 以下情形，請勿繼續使用。
 - 超過保存期限的眼藥水。
 - 開瓶28天後。
 - 藥液混濁、變色或出現異物時。



接背面

- (6) 為避免污染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口，並避免與他人共用，或以其他容器盛裝。
- (7) 如需同時使用兩種以上眼藥時，請依下列方式使用，以免影響藥效：
1. 使用眼藥水與眼藥膏時，請先使用藥水，間隔10分鐘以上再用藥膏。
 2. 使用兩種眼藥水時，建議間隔5分鐘以上。
- (8) 配戴隱形眼鏡時，請勿使用含防腐劑及含懸浮液之眼藥水。
- (9) 過度使用會增加眼睛紅腫。
- (10) 為維持品質，請勿放置於汽車內或暖氣附近等高溫的場所。另外本藥品放在高溫場所可能導致容器變形，致使藥水漏出且藥水品質變化，請勿使用。
- (11) 依據保存狀態，點眼口周圍或瓶蓋內側會有白色的成分結晶附著。這種情況下，請用乾淨的紗布輕輕擦拭後再使用。



用法用量

一天 3 至 4 次 每次 1 至 2 滴

警 語

1. 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

發生部位	症 狀
皮 膚	發疹 / 發紅、搔癢
眼 睛	充血、搔癢、浮腫、刺痛

2. 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
- (1) 連續使用三天（或 72 小時）症狀沒有改善。
 - (2) 使用後產生眼睛劇痛、持續視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。
 - (3) 若有任何不適情況產生。
 - (4) 發生過敏反應。

旋鈕式瓶蓋的開啟方法

請務必瓶口向上打開。

註：按住藥瓶中間打開時會有藥水灑出。



●開啟方式
用拇指握住
整個瓶身後
旋轉瓶蓋。



●關閉方式
向下按緊瓶蓋。

包 裝

100 毫升以下塑膠瓶裝

儲存條件

25°C 以下儲存



製造商 参天製藥株式会社
<https://www.santen.com.tw>

藥 商 台灣參天製藥股份有限公司
台北市中山區松江路126號9樓之1

製造廠 SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. (NOTO PLANT)
2-14, Shikinami, Hodatsushimizu-cho, Hakui-gun, Ishikawa, Japan.

消費者服務熱線 0800-020-580



0 4 0 6

07