

本說明書請與藥水一同保管，  
使用時請仔細閱讀。

Santen

緩解眼睛疲勞/眼睛充血  
**參天<sup>®</sup>沁涼眼藥水**  
**Sante FX V Plus<sup>®</sup>**

衛部藥輸字第026773號

醫師藥師藥劑生指示藥品

Sante FX V Plus 的配方成分中含有 7 種有效成分，包括維生素 / 氨基酸等營養成分。有效緩解眼睛疲勞 / 充血。

### 成分 / 有效成分及含量

成分	含量	作用
維生素 B <sub>6</sub> (Pyridoxine Hydrochloride)	0.1%	緩解眼睛疲勞
Taurine	1.0%	緩解眼睛疲勞
L-potassium Aspartate	1.0%	緩解眼睛疲勞
Neostigmine Methylsulfate	0.005%	—
Tetrahydrozoline Hydrochloride	0.05%	暫時緩解因輕微眼部刺激所引起之不適、或眼睛紅
Chlorpheniramine Maleate	0.03%	抑制組織胺的作用，緩解眼睛癢
ε-Aminocaproic Acid	1.0%	暫時緩解因輕微眼部刺激所引起之不適、或眼睛紅

其他成分 (賦形劑)：添加物含有氯丁醇 (Chlorobutanol)、葡萄糖聚糖 70(Dextran 70)、羥乙基纖維素 (Hydroxyethyl Cellulose)、羥丙基甲基纖維素 (Hypromellose)、氯化苯二甲煙銨 (Benzalkonium Chloride Solution)、硼酸 (Boric Acid)、d-樟腦 (d-Camphor)、d-龍腦 (d-Borneol)、l-薄荷腦 (l-Menthol)、pH 調節劑 (Dilute Hydrochloric Acid, Sodium Hydroxide)、純水 (Purified Water)。

### 用途(適應症)

暫時緩解因輕微眼部刺激所引起之不適、或眼睛紅，眼睛癢，眼睛疲勞。

### 使用上注意事項

- 有下列情形者，請勿使用：  
曾因本藥成分引起過敏的人。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：  
正在接受醫師治療或醫師處方眼藥的人。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：  
青光眼的人。
- 其他使用上注意事項：
  - 為防止兒童誤食請妥善保管。
  - 避免陽光直射。
  - 使用前，請洗淨雙手。
  - 請依照藥品標示使用。
  - 以下情形，請勿繼續使用。
    - 超過保存期限的眼藥水。
    - 開瓶 28 天後。
    - 藥液混濁、變色或出現異物時。



接背面

(6)為避免污染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口，並避免與他人共用，或以其他容器盛裝。

(7)如需同時使用兩種以上眼藥時，請依下列方式使用，以免影響藥效：

1. 使用眼藥水與眼藥膏時，請先使用藥水，間隔10分鐘以上再用藥膏。

2. 使用兩種眼藥水時，建議間隔5分鐘以上

(8)配戴隱形眼鏡時，請勿使用含防腐劑及含懸浮液之眼藥水。

(9)過度使用會增加眼睛紅腫。



## 用法用量

一天 3 至 4 次

每次 1 至 2 滴

## 警 語

1. 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

發生部位	症 狀
皮 膚	發疹 / 發紅、搔癢
眼 睛	充血、搔癢、浮腫、刺痛

2. 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

(1) 連續使用三天（或 72 小時）症狀沒有改善。

(2) 使用後產生眼睛劇痛、持續視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。

(3) 若有任何不適情況產生。

(4) 發生過敏反應。

### 旋鈕瓶蓋的開啟方法

請務必瓶口向上打開。

註：按住藥瓶中間打開時會有藥水灑出。



●開啟方式  
用拇指握住  
整個瓶身後  
旋轉瓶蓋。



●關閉方式  
向下按緊瓶蓋。

## 包 裝

100 毫升以下塑膠瓶裝

## 儲存條件

25°C以下儲存



製造商 参天製藥株式会社  
<https://www.santen.com.tw>

藥 商 台灣參天製藥股份有限公司  
台北市中山區松江路126號9樓之1

製造廠 SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. (NOTO PLANT)  
2-14, Shikinami, Hodatsushimizu-cho, Hakui-gun, Ishikawa, Japan.

消費者服務熱線 0800-020-580

03

0 5 4 2