

本說明書請與藥劑一同保管，  
使用時請仔細閱讀。

Santen

## 緩解眼睛紅/眼睛疲勞

# 參天藍盾®眼藥水

衛部藥輸字第026852號

醫師藥師藥劑生指示藥品

來自電腦及智慧型手機螢幕的藍色光線，即所謂的藍光，會逐日加重眼睛的負擔。Sante PC 含有下述最大濃度配方成分\*：能緩解眼睛疲勞的維生素 B<sub>12</sub>、軟骨素硫酸鈉 (Sodium Chondroitin Sulfate)、維生素 B<sub>6</sub>。本眼藥水含有 8 種成分，能改善眼睛紅及眼睛疲勞等，令眼睛舒暢。對長時間盯著電腦或智慧型手機等的眼睛疲勞亦能發揮效果。

\*一般眼科用藥產銷核可標準的最大濃度：維生素 B<sub>12</sub>、軟骨素硫酸鈉 (Sodium Chondroitin Sulfate)、維生素 B<sub>6</sub>

### 成分/有效成分及含量

成分	含量	作用
維生素 B <sub>12</sub> (Cyanocobalamin)	0.02%	緩解眼睛疲勞
Sodium Chondroitin Sulfate	0.5%	緩解眼睛疲勞
維生素 B <sub>6</sub> (Pyridoxine Hydrochloride)	0.1%	緩解眼睛疲勞
Neostigmine Methylsulfate	0.002%	—
Taurine	0.1%	緩解眼睛疲勞
Dipotassium Glycyrrhizinate	0.1%	暫時緩解因輕微眼部刺激所引起之不適、或眼睛紅
Chlorpheniramine Maleate	0.01%	抑制組織胺的作用，緩解眼睛搔癢
Tetrahydrozoline Hydrochloride	0.03%	暫時緩解因輕微眼部刺激所引起之不適、或眼睛紅

其他成分(賦形劑)：氨基己酸 (ε-Aminocaproic Acid)、Disodium Edetate Hydrate、氯丁醇 (Chlorobutanol)、香葉醇 (Geraniol)、葡萄糖 (Dextran 70)、羥乙基纖維素 (Hydroxyethylcellulose)、氯化苯二甲煙銨 (Benzalkonium Chloride Solution)、聚山梨醇酯 80 (Polysorbate 80)、d-樟腦 (d-Camphor)、l-薄荷腦 (l-Menthol)、等張劑 (Boric Acid, Sodium Chloride, Potassium Chloride)、pH 調節劑 (Dilute Hydrochloric Acid, Sodium Borate)、純水 (Purified Water)。

### 成分/含量相關注意事項

滴用本眼藥水後，可能會在口中感覺到甜味。這是因為成分中含有甘草酸二鉀鹽 (Dipotassium Glycyrrhizinate)，因為透過淚管流入口中而造成的，並非品質上的異常。

### 用途(適應症)

暫時緩解因輕微眼部刺激所引起之不適、或眼睛紅，眼睛癢，眼睛疲勞。

#### 使用上注意事項

- 有下列情形者，請勿使用：
  - 曾因本藥成分引起過敏的人。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
  - 正在接受醫師治療或醫師處方眼藥的人。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
  - 青光眼的人。
  - 曾對其他藥品產生過敏症狀者。
  - 眼睛嚴重疼痛。
- 其他使用上注意事項
  - 為防止兒童誤食請妥善保管。
  - 避免陽光直射。



接背面

- (3) 使用前，請洗淨雙手。
- (4) 請依照藥品標示使用。
- (5) 以下情形，請勿繼續使用。
  1. 超過保存期限的眼藥水。
  2. 開瓶 28 天後。
  3. 藥液混濁、變色或出現異物時。
- (6) 為避免污染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口，並避免與他人共用，或以其他容器盛裝。
- (7) 如需同時使用兩種以上眼藥時，請依下列方式使用，以免影響藥效：
  1. 使用眼藥水與眼藥膏時，請先使用藥水，間隔 10 分鐘以上再用藥膏。
  2. 使用兩種眼藥水時，建議間隔 5 分鐘以上。
- (8) 配戴隱形眼鏡時，請勿使用含防腐劑及含懸浮液之眼藥水。
- (9) 過度使用會增加眼睛紅腫。
- (10) 兒童使用時，請在監護人的指導監督下使用。
- (11) 僅限使用於點眼用途。
- (12) 可能會因保存狀態的不同，在容器點眼藥口周圍產生成分結晶或是在瓶蓋內有紅色附著物。此時請使用乾淨的紗布輕輕擦拭。
- (13) 本藥水的紅色是維生素 B<sub>12</sub> 的顏色。點眼藥時因藥水滴漏而對襯衫等衣物染色時，請立即以清水沖洗。



## 用法用量

一天 3 至 4 次      每次 1 至 2 滴

## 警 語

1. 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

發生部位	症 狀
皮 膚	發疹 / 發紅、搔癢
眼 睛	充血、搔癢、浮腫

2. 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
  - (1) 連續使用三天（或 72 小時）症狀沒有改善。
  - (2) 使用後產生眼睛劇痛、持續視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。
  - (3) 若有任何不適情況產生。
  - (4) 發生過敏反應。

### 旋鈕式瓶蓋的開啟方法

請務必瓶口向上打開。

註：按住藥瓶中間打開時  
會有藥水灑出。



●開啟方式  
用拇指握住  
整個瓶身後  
旋轉瓶蓋。



●關閉方式  
向下按緊瓶蓋。

## 包 裝

100 毫升以下塑膠瓶裝

## 儲存條件

25°C 以下儲存



製造商 参天製藥株式会社  
<https://www.santen.com.tw>

藥 商 台灣参天製藥股份有限公司  
台北市中山區松江路126號9樓之1

製造廠 SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. (NOTO PLANT)  
2-14, Shikinami, Hodatsushimizu-cho, Hakui-gun, Ishikawa, Japan.

消費者服務熱線 0800-020-580

03

0 5 2 2